



АДИАРИН® РЕГИДРО

Специализированный пищевой продукт
диетического лечебного питания
для детей с первых дней жизни и взрослых

Таблица пищевой ценности продукта	В 100 г продукта	В 1 саше
Энергетическая ценность	1126,2 кДж/265 ккал	48,4 кДж/11,4 ккал
Углеводы	66 г	2,84 г
Глюкоза	65,74 г	2,82 г
Хлориды	10,54 г	0,453 г
Натрий	7,88 г	0,339 г
Калий	3,65 г	0,157 г
Цинк	0,07 г	0,003 г

ОСМОЛЯРНОСТЬ: 245 мОсмоль/л.

СОСТАВ: глюкоза, натрия цитрат, натрия хлорид, калия хлорид, диоксид кремния, аминокислотный хелат цинка (мальтодекстрин, цинка бисглицинат хелат, целлюлоза, глицин, натрия карбонат, вода).

ОБЩАЯ МАССА СОДЕРЖИМОГО САШЕ: 4,3 г.

ЧТО ТАКОЕ АДИАРИН® РЕГИДРО?

Продукт диетического (лечебного) питания для детей с первых дней жизни и взрослых, Адиарин® Регидро представляет собой сухую быстрорастворимую смесь, предназначенную для питания детей раннего возраста при обезвоживании организма различной степени тяжести при остром и хроническом диарейном синдроме. Продукт предназначен для коррекции водно-электролитного баланса: предупреждает и уменьшает обезвоживание, восстанавливая потерю воды, натрия и калия, водно-электролитное и кислотно-щелочное равновесие, нарушенное при обезвоживании. По пищевой ценности и содержанию минеральных веществ продукт соответствует стандартам Европейского общества педиатров, гастроэнтерологов и диетологов (ESPGAN) и ВОЗ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для лечебного питания детей с первых дней жизни и взрослых при обезвоживании организма различной степени тяжести при остром и хроническом диарейном синдроме.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: содержимое 1 саше регидратационной соли необходимо растворить в 200 мл кипяченой воды комнатной температуры и тщательно перемешать. Выпивают приготовленный раствор небольшими глотками. С помощью врача необходимо определить количество регидратационного раствора, которое необходимо принять, в зависимости от уровня обезвоживания.

Масса тела (кг)	Схема выпаивания в первые 4-6 часов обезвоживания		Количество регидратационного раствора за один прием (в мл)
	легкая степень	средняя степень	
До 6	3-6 приемов по 50 мл	4-8 приемов по 50 мл	50
6-9	6-9 приемов по 50 мл	8-12 приемов по 50 мл	50
9-12	4-6 приемов по 100 мл	6-8 приемов по 100 мл	100
12-15	4-5 приемов по 150 мл	5-6 приемов по 150 мл	150
15-30	3-7 приемов по 200 мл	5-10 приемов по 200 мл	200
свыше 30 и взрослые	3-8 приемов по 400 мл	5-10 приемов по 400 мл	400

При назначении регидратационного раствора младенцам и детям, рекомендуется продолжать кормление грудью или кормление детскими молочными смесями. Младенцам регидратационный раствор дают чайными ложками, детям постарше – небольшими порциями. В случае возникновения рвоты следует подождать 10-20 минут и повторить прием дозы регидратационного раствора.

Адиарин® Регидро следует принимать с момента появления первых признаков обезвоживания и до тех пор, пока длится диарея. Для грудных детей и детей младшего школьного возраста – не менее 24 часов, для детей старшего возраста и взрослых – не менее 36 часов.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

ФОРМА ВЫПУСКА: 10 саше упакованы в картонную упаковку вместе с инструкцией по применению.

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ: Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети. Не является лекарственным средством.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Приготовленный раствор хранить при температуре 15-25°C не более 24 часов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

**ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В ООО «ЯДРАН»,
119330, Г. МОСКВА, ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР-Т, Д. 38, ОФИС VII,
ТЕЛ./ФАКС: +7 (495) 970-18-82.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
RU.77.99.32.004.E.005340.11.16 от 15.11.2016 г.
www.adiarin.ru



jgl