**ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению лекарственного препарата

(листок-вкладыш)

ГЛИЦЕРИН

- *Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*
- *Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.*

Торговое название препарата: Глицерин

Международное непатентованное название: глицерол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав:

В 1 суппозитории содержится:

Действующее вещество: глицерин (глицерол) – 2,11 г;

Вспомогательные вещества: макрогол 400, стеариновая кислота 95, натрия карбонат декагидрат (натрий углекислый 10-водный).

Описание

Суппозитории торпедообразной формы, прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, гигроскопичны. Допускается наличие воронкообразного углубления с незначительным количеством пузырьков воздуха.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие слабительные средства.

Код АТХ: А06АХ01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Слабительное средство, смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника.

Фармакокинетика

Данных о фармакокинетике глицерола при ректальном применении нет.

Показания к применению

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии.

Способ применения и дозы

Ректально.

Взрослым и детям старше 7 лет - по 1 суппозиторию (2,11 г) 1 раз в сутки.

Продолжительность применения не должна превышать 7 дней.

Длительность лечения определяется врачом индивидуально для каждого пациента с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого лечебного эффекта.



Побочное действие

Аллергические реакции; местные реакции в месте введения суппозитория (чувство дискомфорта, зуд, жжение); боли спастического характера в кишечнике. При длительном применении - ослабление физиологического процесса дефекации.

У пациентов с обезвоживанием после применения глицерина в виде суппозитория возможно развитие тяжёлой дегидратации, приводящей к сердечно-сосудистой недостаточности и отёку лёгких. Описаны случаи развития некетотической гиперосмолярной гипергликемической комы, которая может привести к летальному исходу.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания



Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства; кишечная непроходимость, синдром раздражённого кишечника, аппендицит, желудочно-кишечное кровотечение, диарея, воспалительные заболевания прямой кишки (проктит, парапроктит), геморрой (фаза обострения), трещины заднего прохода, геморрагический ректоколит, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, детский возраст до 7 лет.

С осторожностью

Почечная недостаточность.

Передозировка

Симптомом передозировки является частый жидкий стул. В случае передозировки следует отменить препарат.

Меры предосторожности

Не рекомендуется применять суппозитории более 7 дней. Систематическое применение не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твёрдыми маслами.

При применении остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.


До и после применения суппозитория следует тщательно вымыть руки.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Применение лекарственного средства Глицерин, суппозитории ректальные 2,11 г, у детей до 7 лет противопоказано.

Применение у детей старше 7 лет возможно только после консультации врача и исключения заболеваний, которые могли повлиять на задержку опорожнения кишечника.



Применение лекарственного средства у детей необходимо осуществлять под наблюдением врача.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение в период беременности и кормления грудью возможно только после консультации врача в случае, если польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка. Назначение лекарственного средства женщинам в течение первого триместра беременности не рекомендовано.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет сведений.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимые взаимодействия глицерола с другими лекарственными средствами не выявлены.

При одновременном применении других ректально вводимых лекарственных средств, следует учитывать слабительный эффект препарата. При необходимости использования других ректальных препаратов следует соблюдать интервал между их применением не менее 1 часа.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 2,11 г. 5 суппозитория помещают в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки алюминий - полиэтилен. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.



Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.



НД РБ

8469 - 2017

Производитель

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВО НАРКОБОСРРАНИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Центр Минздрава «Стратегическая
Республика Беларусь»

