

НД РБ

7079 - 2019



## Листок-вкладыш – информация для пациента

### КАГОЦЕЛ® , 12 мг, таблетки

Кагоцел

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается в течение 2 недель или оно ухудшается через 2-3 дня, Вам следует обратиться к врачу.

---

#### Содержание листка-вкладыша

---

1. Что из себя представляет препарат Кагоцел, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Кагоцел
3. Прием препарата Кагоцел
4. Возможные побочные эффекты
5. Хранение препарата Кагоцел
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

---

#### 1. Что из себя представляет препарат Кагоцел и для чего его применяют

---

Кагоцел относится к противовирусным препаратам. Он стимулирует продукцию интерферонов, обеспечивающих иммунную защиту от вирусных инфекций.

Препарат Кагоцел применяют у взрослых и детей в возрасте от 3 лет для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а также для лечения герпеса у взрослых.

## 2. О чем следует знать перед приемом препарата Кагоцел

### *Не принимайте препарат Кагоцел:*

- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью;
- если у Вас есть повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- если у Вас есть дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.



Если вы не уверены в том, стоит ли начинать прием препарата Кагоцел, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

### *Особые указания и меры предосторожности*

- Для достижения лечебного эффекта начинайте прием препарата не позднее четвертого дня от начала заболевания.

### *Дети*

- Препарат Кагоцел не предназначен для приема детям в возрасте до 3 лет.
- В связи с незрелостью глотательного рефлекса у детей младше 6-летнего возраста могут возникать трудности при проглатывании таблеток, что связано с повышенным риском попадания таблетки в дыхательные пути. Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка и соблюдать меры осторожности при использовании таблеток Кагоцел у детей младше 6 лет.

### *Применение других лекарств*

- Препарат Кагоцел хорошо сочетается с другими противовирусными препаратами, иммуномодуляторами и антибиотиками, усиливая их действие (аддитивный эффект).

### *Беременность и грудное вскармливание*

- Препарат Кагоцел не следует применять при беременности и грудном вскармливании.

### *Управление транспортными средствами и работа с механизмами*

- Влияние препарата на способность к управлению транспортными средствами, механизмами не изучено.

### *Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ*

- Препарат Кагоцел содержит лактозу. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.



### 3. Прием препарата Кагоцел

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемые дозы**

- **Лечение гриппа и ОРВИ у взрослых**

В первые два дня – по 2 таблетки 3 раза в день, в последующие два дня – по одной таблетке 3 раза в день. Всего на курс – 18 таблеток, длительность курса – 4 дня.

- **Профилактика гриппа и ОРВИ у взрослых**

Проводится 7-дневными циклами: два дня – по 2 таблетки 1 раз в день, 5 дней перерыв, затем цикл повторить. Длительность профилактического курса – от одной недели до нескольких месяцев.

- **Лечение герпеса у взрослых**

По 2 таблетки 3 раза в день в течение 5 дней. Всего на курс – 30 таблеток, длительность курса – 5 дней.

- **Лечение гриппа и ОРВИ у детей в возрасте от 3 до 6 лет**

В первые два дня – по 1 таблетке 2 раза в день, в последующие два дня – по одной таблетке 1 раз в день. Всего на курс – 6 таблеток, длительность курса – 4 дня.

- **Лечение гриппа и ОРВИ у детей в возрасте от 6 лет**

В первые два дня – по 1 таблетке 3 раза в день, в последующие два дня – по одной таблетке 2 раза в день. Всего на курс – 10 таблеток, длительность курса – 4 дня.

- **Профилактика гриппа и ОРВИ у детей в возрасте от 3 лет**

Проводится 7-дневными циклами: два дня – по 1 таблетке 1 раз в день, 5 дней перерыв, затем цикл повторить. Длительность профилактического курса – от одной недели до нескольких месяцев.

#### **Способ введения**

Для приема внутрь.

#### **Если Вы приняли препарата Кагоцел больше, чем следовало,**

Примите большое количество жидкости, вызовите рвоту, после чего обратитесь за консультацией к врачу.

#### **Если Вы забыли принять препарат Кагоцел**

Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы восполнить пропущенную дозу. Продолжите прием препарата в соответствии с прежней схемой.

#### **Если Вы прекратите прием препарата Кагоцел**

Не существует вредных последствий в случае прекращения приема препарата.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

---


#### 4. Возможные побочные эффекты

---

Подобно всем лекарственным препаратам, Кагоцел может вызывать побочные эффекты, однако они возникают не у всех.

Сообщите лечащему врачу, если вы заметили у себя и обеспокоены чем-либо из перечисленного:

- сыпь,
- крапивница,
- зуд кожи,
- отек Квинке,
- тошнота,
- частый жидкий стул,
- боль в области желудка.



Частота перечисленных выше нежелательных реакций неизвестна (по имеющимся данным определить частоту не представляется возможным).

#### *Сообщение о нежелательных реакциях*

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

---

#### 5. Хранение препарата Кагоцел

---

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (в пачке) для защиты от света.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке, или если упаковка порвана или имеет признаки ее повреждения.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

---

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

---

### ***Препарат Кагоцел содержит***

Действующее вещество кагоцел 12 мг (в пересчёте на сухое вещество).

Вспомогательными веществами являются крахмал картофельный, кальция стеарат, лактозы моногидрат, повидон, кросповидон.

### ***Внешний вид препарата Кагоцел и содержимое упаковки***

Препарат Кагоцел – таблетки от белого с коричневатым оттенком до светло-коричневого цвета круглые двояковыпуклые с вкраплениями коричневого цвета.

Препарат выпускается по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке с перфорацией или по 10, 15 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке без перфорации из пленки ПВХ/ПВДХ (поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной – PVC/PVDC) и фольги алюминиевой с термосвариваемым покрытием.

1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток, или 1 контурную ячейковую упаковку по 20 таблеток, или 2 контурные ячейковые упаковки по 15 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

### ***Порядок розничной реализации препарата***

Без рецепта врача.

### ***Держатель регистрационного удостоверения и производитель***

**Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», Россия

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 стр. 5, этаж 3, помещ. 17.

Тел.: +7 (495) 646-28-68

e-mail: info@binnopharmgroup.ru

### **Производитель**

ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА», Россия.

*Адрес места производства:*

Калужская область, г.о. город Обнинск, г. Обнинск, шоссе Киевское, д. 120, к. 4.

*Выпускающий контроль качества:*

Калужская область, г.о. город Обнинск, г. Обнинск, шоссе Киевское, д. 120, к. 7.

Листок-вкладыш пересмотрен

