


2666 Б-2019

**Листок-вкладыш – информация для потребителя****МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД,****раствор для наружного применения**

Действующие вещества: прокаина гидрохлорид + бензокайн (анестезин) +
левоментол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней вам следует обратиться к врачу

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД
3. Применение препарата МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД,
и для чего его применяют**

МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД – комбинированное средство, которое благодаря входящим в состав левоментолу, бензокайну и прокайну оказывает обезболивающее и противозудное местное действие.

Применяется для облегчения болевого синдрома при невралгии, миалгии и артрапатии, уменьшения зуда при зудящих дерматозах.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу через 7 дней.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД**

Не применяйте МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД, если:

- у вас аллергия на левоментол, бензокайн или прокайн, либо на любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- у вас есть в анамнезе аллергические реакции на местные анестетики (обезболивающие), такие как прокайн, бутакайн или любые другие «-каиновые»



анестетики;

- у вас подозрение на метгемоглобинемию (состояние, характеризующееся появлением в крови повышенного количества метгемоглобина);
- у вас склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш;
- у вас эpileпсия, судороги в анамнезе;

МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД не рекомендуется использовать у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Препарат нельзя наносить на большие участки кожи, на участки кожи с проявлениями экземы, солнечных ожогов, инфекции или повреждения.

Не применяйте МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД, если вы используете другие лекарственные препараты для местного применения, сульфаниламиды или ингибиторы холинэстеразы. Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите лечащему врачу и прекратите применение МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Местные анестетики не следует применять пациентам с полной блокадой сердца (полным прекращением проведения импульса на предсердия и некоторые другие отделы сердца).

Перед использованием МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД вы должны проконсультироваться с врачом, если у вас есть зуд по всему телу. Не наносить на поврежденную кожу и кожу с проявлениями аллергии!

При нанесении раствора на кожу не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отека или высыпаний на коже необходимо прекратить применение лекарственного препарата и немедленно обратиться к врачу. После местного применения средств, содержащих ментол, были сообщения о развитии ожогов. После нанесения лекарственного препарата не рекомендуется применять местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновений кожных реакций. Пациентам с повышенной чувствительностью не следует принимать горячий душ или ванну до или после применения лекарственного препарата.

Если после применения лекарственного препарата эффект отсутствует или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Не наносить на кожу лица!

Не следует допускать попадание раствора в глаза, поскольку ментол, который содержится в препарате, может вызвать сильное раздражение!

Если вы случайно проглотили МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД, обратитесь к врачу.

Другие препараты и препарат МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без назначения.

Некоторые препараты можно принимать вместе с МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД, а другие могут вызывать нежелательные реакции при приеме с МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД. В частности, МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД может взаимодействовать с лекарственными препаратами, перечисленными ниже:

- Компоненты препарата снижают антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов; усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием (в частности, бензокаин).
- Ингибиторы холинэстеразы (например, галантамин, донепезил) ингибируют метаболизм бензокаина.
- При одновременном применении с другими препаратами для местного применения могут создаваться новые соединения с непредвиденным эффектом.

2666 Б-2019

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Беременность, грудное вскармливание и fertильность
Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не следует применять МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД во время беременности и в период лактации.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние на способность управления автотранспортом или работу с другими механизмами не выявлено.

3. Применение препарата МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат применяют наружно.

Болезненные участки кожи необходимо растирать МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД 2-3 раза в день. При сохранении болевого синдрома или кожного зуда более 7 дней, рекомендуется обратиться к врачу.

Применение МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД не рекомендовано у детей и подростков до 18 лет.

При продолжительном применении возможны головокружение, общая слабость, снижение артериального давления. Терапия симптоматическая.

Вдыхание больших доз ментола может привести к развитию головокружения, спутанности сознания, мышечной слабости, тошноты и двоения в глазах.

При случайном приеме лекарственного препарата внутрь обратитесь к врачу или в больницу. Возможно развитие желудочно-кишечных расстройств, тошноты, диареи, нарушения сердечного ритма и других симптомов.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно сообщите лечащему врачу, если вы испытываете любой из ниже перечисленных симптомов после применения МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД, так как симптомы могут ухудшаться.

Возможны раздражения кожи, сыпь; частота неизвестна (не может быть оценена по имеющимся данным): реакции гиперчувствительности, аллергический дерматит, метгемоглобинемия (состояние, характеризующееся появлением в крови повышенного количества метгемоглобина).

У пациентов с повышенной чувствительностью возможны бронхоспазм, ларингоспазм, для которых характерно затрудненное дыхание, и приостановка дыхания (апноэ).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Храните препарат в оригинальной упаковке.

2666 Б-2019

Срок годности – 2 года.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

СОГЛАСОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Приказ Министерства здравоохранения

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не применяйте препарат, если вы заметили, что флакон, в котором находится препарат, поврежден.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Один миллилитр МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД содержит действующие вещества: прокайн гидрохлорид – 10 мг, бензокайн (анестезин) – 10 мг, левоментол – 25 мг.

Прочими вспомогательными веществами является спирт этиловый 70 %.

Внешний вид препарата МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД и содержимое упаковки

МЕНОВАЗИН-БЕЛМЕД, раствор для наружного применения, представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с запахом ментола.

По 50 мл во флаконы светозащитного стекла, укупоренные пробками с уплотнительным элементом и крышками навинчивающими, или крышками укупорочно-навинчивающими с контролем первого вскрытия. На флакон наклеивают этикетку из бумаги писчей, или этикетку самоклеящуюся, или этикетку многостраничную. Каждый флакон с этикеткой из бумаги писчей или этикеткой самоклеящейся вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,
 Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
 ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,
 e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: