

**Инструкция  
по медицинскому применению лекарственного средства  
(информация для специалистов)**

**КАМЕТОН**

**Торговое название**  
Каметон

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от «20» 11 2017 № 1322

**Международное непатентованное название**  
Отсутствует

**Форма выпуска**  
Аэрозоль

**Состав**

Один баллон содержит:

*активные вещества:* хлорбутанол гемигидрат - 0,1 г, камфора рацемическая - 0,1 г, левоментол - 0,1 г, масло эвкалиптовое - 0,1 г;

*вспомогательные вещества:* изопропилмиристат, хладон 134а.

**Описание**

Бесцветная или слегка желтоватого цвета прозрачная жидкость со специфическим запахом. Допускается опалесценция.

**Фармакотерапевтическая группа**

Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Код ATC: R02AA20

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Каметон проявляет противовоспалительное, антисептическое и легкое местнообезболивающее действие. Комбинированное сочетание хлорбутанолгидрата, камфоры и масла эвкалиптового оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие, облегчает отделение вязкого секрета, скапливающегося в верхних отделах дыхательных путей. Левоментол действует в качестве мягкого местноанестезирующего агента, обладает дезодорирующими эффектом.

**Фармакокинетика**

Не исследовалась.

**Показания для применения**

Местное лечение острых и хронических (преимущественно в стадии обострения) инфекционно-воспалительных заболеваний горла и носа: тонзиллита, фарингита, ларингита, ринита.

**Способы применения и дозировка**

Лекарственное средство назначают взрослым и детям с 5 лет. Для применения препарата необходимо с распылителя снять защитный колпачок, затем распылитель ввести в полость носа на глубину 0,5 см или рта и нажимать на основание распылителя до упора. Содержимое баллона при этом распыляется в мелкодисперсном состоянии. За 1 нажатие распыляется 0,1 г лекарственного средства, в котором содержится суммарно 1,33 мг действующих веществ.

При лечении ринита предварительно следует очистить нос от слизи. Распыление лекарственного средства следует проводить на фазе вдоха. За одно применение у взрослых и детей старше 15 лет осуществляют по 2-3 распыления в каждую ноздрю, у детей от 12 до 15 лет - по 1-2 распыления, у детей в возрасте от 5 до 12 лет - по 1 распылению. Частота применения - 3-4 раза в сутки.

При терапии воспалительных заболеваний глотки и горлани (тонзиллит, фарингит, ларингит) лекарственное средство следует применять после еды. Перед применением ротовую полость нужно прополоскать теплой кипяченой водой. За одно применение у взрослых и детей старше 15 лет осуществляют по 2-3 распыления, у детей от 12 до 15 лет - по 1-2 распыления, у детей в возрасте от 5 до 12 лет - по 1 распылению. Частота применения - 3-4 раза в сутки. После распыления препарата в полости рта, рекомендуется некоторое время (5-10 минут) воздерживаться от приема пищи и воды для обеспечения максимального воздействия.

Продолжительность лечения непрерывно обычно составляет 6-7 суток (определяет врач индивидуально). Лекарственное средство не следует применять дольше 1 недели.

### **Побочное действие**

*Со стороны иммунной системы:* аллергические реакции, включая крапивницу, зуд, высыпания на коже, отек в месте контакта, у лиц с повышенной чувствительностью возможно развитие ангионевротического отека (отек Квинке).

*Со стороны дыхательной системы:* одышка, ощущение сухости слизистой оболочки горла и носа.

*Местные эффекты:* ощущение першения или жжения во рту.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Детский возраст до 5 лет.

### **Передозировка**

Передозировка препарата может вызвать усиление побочных эффектов. Терапия симптоматическая.

Лечение: прекращение применения препарата, симптоматическая терапия.

### **Меры предосторожности**

Не распылять вблизи огня. Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, оберегать от ударов. После применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок, чтобы предотвратить его загрязнение. При впрыскивании в нос не запрокидывать голову и не переворачивать баллон. Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном нескольким лицам, чтобы избежать распространения инфекции. Во время распыления препарата следует избегать его попадания в глаза.

Лекарственное средство следует с осторожностью применять детям, поскольку возможно развитие бронхоспазма. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.

Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Пациентам с бронхиальной астмой или респираторными заболеваниями, сопровождающимися гиперреактивностью дыхательных путей, лекарственное средство следует применять с осторожностью из-за риска бронхоспазма. Необходимо соблюдать осторожность у пациентов с воспалительными заболеваниями или изъязвлениями желудочно-кишечного тракта.

Пациентам с судорогами в анамнезе перед применением следует проконсультироваться с врачом, так как лекарственное средство содержит в составе производные терпенов, которые

могут понизить порог судорожной готовности. Если во время **применения лекарственного средства** симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

### Дети

Препарат противопоказан детям младше 5 лет.

Детям старше 5 лет лекарственное средство применяют по назначению врача, под его наблюдением.

Препарат не следует применять у детей с судорогами в анамнезе (в том числе фебрильными). Использование у детей возможно при условии, что они не сопротивляются введению постороннего предмета (распылителя) и способны контролировать дыхание при распылении.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Неизвестно. В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

### Применение в период беременности и лактации

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием данных, использовать лекарственное средство в период беременности и лактации не рекомендуется.

### Влияние на способность управлять автомобилем и работу с движущими механизмами

Исследования по оценке влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились. Принимая во внимание профиль побочных реакций, такого влияния не ожидается.

### Форма выпуска и упаковка

По 30 г в баллоны аэрозольные алюминиевые с клапанами дозирующего действия. Баллоны обеспечены защитным колпачком и распылителем для носа "РН-1" с защитным колпачком. Каждый баллон с защитным колпачком, каждый распылитель с защитным колпачком и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

### Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

### Срок годности

2 года. Препарат не должен применяться по истечении срока годности.

### Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

### Информация о производителе (заявителе)

*Произведено и расфасовано*

АО «Стома», Украина

61105 г. Харьков, ул. Ньютона, 3

### Упаковано

ООО «БЕЛАЛЕК», Республика Беларусь

222163 г. Жодино, ул. Советская, 9

тел.: +375447777701  
e-mail: [info@belalek.by](mailto:info@belalek.by)

