

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ (информация для пациентов) по медицинскому применению лекарственного средства **КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА**

Торговое название: Календулы настойка

Форма выпуска: настойка.

Описание: прозрачный раствор коричневого цвета. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Состав: спиртовое извлечение из календулы цветков 1:10. Содержит не менее 67 % этианола.

Фармакотерапевтическая группа: лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний горла. Антисептические средства.

Код АТХ: R02AA.

Показания к применению

Лекарственное средство применяется для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и горла (тонзиллит), симптоматического лечения легких воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных ран.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема. Детский возраст до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи). Детский возраст до

12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях горла и гортани). Период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

При наружном применении и для полоскания горла 1 чайную ложку (около 140 капель) настойки календулы разводят в стакане теплой кипяченой воды. Приготовленный раствор применяют для полосканий горла и для наружного применения (повязки, аппликации).

Способ применения при заболеваниях кожи зависит от характера поражения и определяется врачом.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этианола.

Побочное действие

Аллергические реакции. В редких случаях – возникновение дерматита в месте аппликаций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Особые указания

Не применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на препараты календулы.

Если после применения лекарственного средства в течение одной недели симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

В случае ухудшения состояния или появления признаков инфицирования раны, необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности и кормления грудью

В связи с отсутствием достаточных клинических данных не рекомендуется применять лекарственное средство в период беременности и кормления грудью.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Применение у детей

Лекарственное средство не рекомендовано для детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи), для детей до 12 лет – для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и горла).

Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! При случайном приеме внутрь лекарственное средство влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами. Следует соблюдать осторожность во время местного применения лекарственного средства.

Передозировка

Возможно усиление побочных явлений.

Лечение: отмена лекарственного средства, при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Негативные взаимодействия с другими лекарственными средствами не описаны.

Упаковка

50 мл во флаконе из стекла. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Беречь от огня.

Срок годности

2,5 года.

Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177) 735612, 731156.