

Листок-вкладыш – информация для потребителя
СЕЛЕЦЕФ, таблетки, покрытые оболочкой 250 мг и 500 мг
Действующее вещество: цефуроксим (в виде цефуроксима аксетила аморфного)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат СЕЛЕЦЕФ и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата СЕЛЕЦЕФ
3. Применение препарата СЕЛЕЦЕФ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата СЕЛЕЦЕФ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что собой представляет препарат СЕЛЕЦЕФ, и для чего его применяют

Препарят СЕЛЕЦЕФ представляет собой антибиотик, который применяется у взрослых и детей. Он уничтожает бактерии, которые вызывают инфекции. Принадлежит к группе лекарственных препаратов, которые называются цефалоспоринами.

СЕЛЕЦЕФ применяется для лечения инфекций, перечисленных ниже, у взрослых и детей в возрасте от 3 месяцев:

- инфекции горла (острый стрептококковый тонзиллит и фарингит);
- инфекции носа (острый бактериальный синусит);
- инфекции среднего уха (острый средний отит);
- инфекции нижних дыхательных путей (обострения хронического бронхита);
- инфекции мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит);
- инфекции кожи и мягких тканей (неосложненные).

СЕЛЕЦЕФ также можно применять при:


- ранней стадии болезни Лайма (инфекция, распространяемая клещами).

Ваш лечащий врач определит вид бактерий, которые вызвали инфекцию и будет контролировать их чувствительность к препарату СЕЛЕЦЕФ в течение лечения.

2. О чем следует знать перед применением препарата СЕЛЕЦЕФ

Не принимайте СЕЛЕЦЕФ, если:

- у Вас аллергия на цефуроксим или любой из компонентов препарата, перечисленных в разделе 6;
- у Вас аллергия на цефалоспориновые антибиотики;
- у Вас была серьезная аллергическая реакция (гиперчувствительность) на любые другие бета-лактамные антибактериальные средства (пенициллины, монобактамы, карбапенемы).



Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеуказанного, сообщите лечащему врачу перед применением препарата СЕЛЕЦЕФ.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением СЕЛЕЦЕФА проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Дети

СЕЛЕЦЕФ не применяется у детей младше 3 месяцев, безопасность и эффективность в данной возрастной группе не установлена.

Вы должны следить за определенными симптомами, такими как аллергические реакции, грибковые инфекции (такие как кандидоз) и тяжелая диарея (псевдомембранный колит), во время применения СЕЛЕЦЕФ. Это снизит риск любых осложнений. См. «Состояния, на которые нужно обратить внимание» в Разделе 4.

Если Вам необходимо сдать анализ крови

СЕЛЕЦЕФ может влиять на результаты уровня сахара в крови или результаты анализа, который называется пробой Кумбса. Если Вам необходимо выполнить данные анализы, то перед забором крови обязательно предупредите об этом врача.

Другие препараты и СЕЛЕЦЕФ

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится и к препаратам, отпускаемым без рецепта врача. Сообщите врачу, если Вы принимаете:

- препараты, уменьшающие кислотность желудочного сока (например, антациды, которые применяются для лечения изжоги);
- пробенецид (лекарственный препарат для лечения подагры);
- пероральные антикоагулянты;
- комбинированные пероральные контрацептивы. СЕЛЕЦЕФ может снижать эффективность пероральных контрацептивов. Если Вы принимаете пероральные контрацептивы во время лечения препаратом СЕЛЕЦЕФ, Вам необходимо дополнительно использовать барьерный метод контрацепции (такой как презерватив). Просоветайтесь с лечащим врачом.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом перед применением СЕЛЕЦЕФА.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

СЕЛЕЦЕФ может вызывать головокружение и другие нежелательные явления, которые могут снизить внимательность. При появлении данных симптомов откажитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами и обратитесь к врачу.

СЕЛЕЦЕФ содержит маннитол

Маннитол может оказывать слабое слабительное действие, проконсультируйтесь с врачом перед применением СЕЛЕЦЕФ.


3. Применение препарата СЕЛЕЦЕФ

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Способ применения

Принимайте СЕЛЕЦЕФ после еды для более эффективного лечения.

Проглатывайте таблетки СЕЛЕЦЕФ целиком, запивая достаточным количеством воды. Не разжевывайте, не измельчайте и не разламывайте таблетки – это может снизить эффективность лечения.



У детей до 6 лет, которые могут испытать трудности при глотании, следует применять цефуроксим в форме суспензии.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Рекомендуемая доза СЕЛЕЦЕФ составляет от 250 мг до 500 мг два раза в день, в зависимости от тяжести и типа инфекции.

Дети

Рекомендуемая доза СЕЛЕЦЕФ составляет от 10 мг/кг (максимум 125 мг) до 15 мг/кг (максимум 500 мг) два раза в день, в зависимости от тяжести и типа инфекции.

Цефуроксим не применяется у детей младше 3 месяцев, отсутствуют данные по безопасности и эффективности применения в данной возрастной группе.

В зависимости от тяжести заболевания и от ответа на проводимое лечение, начальная доза может быть изменена или может потребоваться более чем один курс лечения.

Пациенты с нарушением функции почек

Если у Вас наблюдаются нарушения функции почек, то Ваш лечащий врач может изменить дозу препарата. Сообщите Вашему врачу, если у Вас есть нарушения функции почек.

Если Вы приняли препарата СЕЛЕЦЕФ больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком большую дозу препарата СЕЛЕЦЕФ, это может привести к неврологическим осложнениям, в частности, у Вас могут появиться припадки (судороги). Не откладывайте. Немедленно обратитесь к врачу или в ближайшее отделение неотложной помощи. Если возможно, покажите им упаковку от препарата СЕЛЕЦЕФ.

Если Вы пропустили прием препарата СЕЛЕЦЕФ

Если Вы пропустили прием препарата СЕЛЕЦЕФ, не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Примите следующую дозу в обычное время.

Если Вы досрочно прекращаете прием препарата СЕЛЕЦЕФ

Не прекращайте прием препарата СЕЛЕЦЕФ без консультации с врачом.

Важно, чтобы Вы получили полный курс лечения препаратом СЕЛЕЦЕФ. Ваш лечащий врач сообщит Вам, как долго нужно принимать СЕЛЕЦЕФ. Если Вы досрочно прекратите прием препарата, это может привести к возврату заболевания.

При наличии дополнительных вопросов по применению данного препарата обратитесь к врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, СЕЛЕЦЕФ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Состояния, на которые нужно обратить внимание

У небольшого количества людей, которые принимают СЕЛЕЦЕФ, развивается аллергическая реакция или потенциально серьезная кожная реакция. Симптомы этих реакций включают в себя:

- тяжелая аллергическая реакция. Признаки включают повышенную и зудящую сыпь, отек, иногда лица или рта вызывающий проблемы с дыханием;
- кожная сыпь, которая может покрыться пузырями и выглядеть как маленькие мишени (центральное темное пятно, окруженное более светлой областью, с темным кольцом по краю);
- распространенная сыпь с волдырями и шелушением кожи (это могут быть признаки синдрома Стивенса-Джонсона или токсического эпидермального некроза).

Другие состояния, на которые Вы должны обратить внимание при применении препарата СЕЛЕЦЕФ:

- грибковая инфекция. Такие препараты, как СЕЛЕЦЕФ, могут вызвать чрезмерный рост грибков (*Candida*) в организме, что может привести к грибковым инфекциям (таким как молочница). Эта нежелательная реакция более вероятна, если Вы принимаете СЕЛЕЦЕФ в течение длительного времени;
- тяжелая диарея (псевдомемброзный колит). Такие лекарственные препараты, как СЕЛЕЦЕФ, могут вызывать воспаление толстой кишки, вызывая тяжелую диарею, обычно с кровью и слизью, боли в животе, лихорадку;
- реакция Яриша-Герксгеймера. У некоторых пациентов может наблюдаться высокая температура (лихорадка), озноб, головная боль, мышечные боли и кожная сыпь во время лечения болезни Лайма препаратом СЕЛЕЦЕФ. Данное состояние известно как реакция Яриша-Герксгеймера. Симптомы обычно делятся от нескольких часов или до одного дня.

Немедленно обратитесь к врачу, если у Вас появился какой-либо из этих симптомов.

При применении препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Часто (могут проявляться менее чем у 1 из 10 человек):

- грибковая инфекция (такая как *Candida*);
- головная боль;
- головокружение;
- диарея;
- тошнота;
- боли в животе.

Частые нежелательные явления по лабораторным и инструментальным данным:

- увеличение типов лейкоцитов (эозинофилия);
- транзиторное повышение активности «печеночных» ферментов (аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы).

Нечасто (могут проявляться менее чем у 1 из 100 человек):

- рвота;
- кожная сыпь.

Нечастые нежелательные явления по лабораторным и инструментальным данным:

- снижение количества тромбоцитов в крови (клеток, которые помогают крови свернуться);
- снижение количества лейкоцитов;
- ложноположительная проба Кумбса.

Другие нежелательные реакции

Другие нежелательные реакции, которые наблюдались у очень небольшого количества людей, но их точная частота возникновения неизвестна:

- тяжелая диарея (псевдомемброзный колит);
- аллергическая реакция;
- кожная реакция (включая серьезные);
- высокая температура (лихорадка);
- пожелтение белков глаз или кожи;
- воспаление печени (гепатит).


Нежелательные явления по лабораторным и инструментальным данным:

- слишком быстрое разрушение красных клеток крови (гемолитическая анемия).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая



сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата СЕЛЕЦЕФ

Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Одна таблетка дозировкой 250 мг содержит действующее вещество: цефуроксима (в виде цефуроксимида ацетила аморфного) – 250 мг;

вспомогательные вещества: лимонная кислота безводная Е 330, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный Е 551, кросповидон Е 1201, кальция карбоксиметилцеллюлоза, натрия лаурилсульфат, маннитол Е 421, крахмал кукурузный, стеропакс, тальк очищенный Е 553b, оболочка Опадрай II (85F48105) белый (поливиниловый спирт, частично гидролизованный Е 1203, макрогол/полиэтиленгликоль 3350, тальк, титана диоксид Е 171).

Одна таблетка дозировкой 500 мг содержит действующее вещество: цефуроксима (в виде цефуроксимида ацетила аморфного) – 500 мг;

вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный безводный Е 551, кросповидон Е 1201, кальция карбоксиметилцеллюлоза, натрия лаурилсульфат, маннитол Е 421, крахмал кукурузный, стеропакс, тальк очищенный Е 553b, оболочка Опадрай II (85F48105) белый (поливиниловый спирт, частично гидролизованный Е 1203, макрогол/полиэтиленгликоль 3350, тальк, титана диоксид Е 171).

Внешний вид препарата СЕЛЕЦЕФ и содержимое упаковки

СЕЛЕЦЕФ – таблетки, покрытые оболочкой, белого или почти белого с желтовато-коричневатым оттенком цвета, круглые, двояковыпуклые. Допускается наличие вкраплений желтовато-коричневатого цвета. На поверхности таблеток допускается шероховатость пленочного покрытия.

По 10 таблеток во флаконы из темного стекла, укупоренные крышками. В каждый флакон вкладывают влагопоглотитель – силикагель, фасованный в бумажной упаковке. Один флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

РУП «Белмедпрепараты»,
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: