


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ****ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ, ТАБЛЕТКИ 6,7 МГ/250 МГ**

Термопсиса ланцетного трава, натрия гидрокарбонат

- Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.
- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестрой.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается вам следует обратиться к врачу.

**СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ**

1. Что из себя представляет препарат Таблетки от кашля, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Таблетки от кашля.
3. Применение препарата Таблетки от кашля.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Таблетки от кашля.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Таблетки от кашля содержат действующие вещества: термопсиса ланцетного трава, натрия гидрокарбонат.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие препараты. Комбинированные препараты.

Код АТС R05CA10.

Таблетки от кашля применяют в комплексной терапии заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит).

Применение препарата по указанным назначениям основывается на опыте продолжительного применения.

**Способ действия препарата Таблетки от кашля.** Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на

рецепторы слизистой оболочки желудка. Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин и термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и, в высоких дозах, на рвотные центры. Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.

Максимум действия наступает через 30-60 мин после приема внутрь и длится в течение 2-6 ч. Выводится из организма почками, слизистой оболочкой дыхательных путей и бронхиальными железами.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## **2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ**

**Не применяйте препарат Таблетки от кашля, если у вас:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- легочные заболевания со склонностью к кровохарканию (рак и туберкулез легких при наличии кровотечения);
- аллергия на действующие вещества или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

**Особые указания и меры предосторожности.** Перед применением препарата Таблетки от кашля проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначить обильное теплое питье.

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,0279 г углеводов (0,0023 ХЕ).

**Дети.** Не давайте препарат детям до 18 лет вследствие недостаточного количества данных о его эффективности и безопасности.

**Другие препараты и препарат Таблетки от кашля.** Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте.

Таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение разжиженной мокроты.

**Беременность, грудное вскармливание и фертильность.** Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

**Управление транспортными средствами и работа с механизмами.** Таблетки от кашля не влияют на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

### **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ**

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Для приема внутрь. Взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения в течение 3-5 дней.

Необходимость назначения повторного курса определяется врачом.

Если вы приняли препарата Таблетки от кашля больше, чем следовало, то может возникнуть тошнота и рвота. Необходимое лечение: промывание желудка, активированный уголь, симптоматическая терапия.

### **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможны аллергические реакции, тошнота.

**Сообщение о нежелательных реакциях.** Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по медицинскому применению. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

### **5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ**

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги и света при температуре не выше 25 °С.

НД РБ

30115-2022



Срок годности - 4 года.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Каждая таблетка содержит 6,7 мг термопсиса ланцетного травы, 250 мг натрия гидрокарбоната.

Вспомогательными веществами являются крахмал картофельный, тальк.

Таблетки плоскоцилиндрические от зеленовато-серого до серого с коричневатым оттенком цвета с фаской. Допускается наличие более темных и светлых вкраплений.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

СОАО «Ферейн», Республика Беларусь,

220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52А,

тел./факс: +375 17 394-92-18, тел.: +375 17 222-97-73, +375 17 213-12-58,

e-mail: office@ferane.by

### **Производитель готовой лекарственной формы**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Российская Федерация,

тел./факс: +7 495 716-15-81, +7 495 716-15-90

**Данный листок-вкладыш пересмотрен**