


НД РБ

1681Б-2017



**Листок-вкладыш – информация для потребителя**  
**Гепарин, 1000 МЕ/г, гель для наружного применения**  
Действующее вещество: гепарин натрия

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Гепарин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Гепарин.
3. Применение препарата Гепарин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гепарин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Гепарин, и для чего его применяют**

В качестве действующего вещества препарат Гепарин содержит гепарин натрия, который обладает местным антикоагулянтным (антитромботическим) действием и относится к группе препаратов для лечения варикозного расширения вен. Препарат выпускается в виде геля для наружного применения. Он улучшает кровообращение в области нанесения и устраняет отек, что приводит к быстрому облегчению болевого синдрома.

**Показания к применению**

Препарат применяется у взрослых:

- для симптоматической терапии при острых отеках и кровоподтеках после тупых травм (ушибы, спортивные травмы);
- для симптоматического лечения заболеваний поверхностных вен (варикозное расширение, флебит, перифлебит, тромбофлебит), варикозных язв, варикофлебита, состояния после удаления большой подкожной вены бедра в составе комплексной терапии.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед применением препарата Гепарин**

**Противопоказания**

**Не применяйте препарат Гепарин:**

- если у Вас аллергия на гепарин или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.
- если у Вас известная гепарин-индуцированная тромбоцитопения, повышенная склонность к кровотечениям.

НД РБ

### **Особые указания и меры предосторожности**

16815-2017

Перед применением препарата Гепарин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Гепарин гель не следует применять при кровотечениях, наносить на открытые раневые поверхности, мокнущую экзему или на слизистые оболочки (область глаз, носа и рта), а также на инфицированные участки при наличии гнойных процессов.

При венозных заболеваниях тромботического характера (например, тромбозах) применяйте препарат с осторожностью, избегая массирующих движений.

При подозрении на тромбоз (состояние, которое характеризуется образованием тромбов в глубоких венах) и/или флебит (воспаление стенки венозного сосуда, сопровождающееся отеком) Вам следует проконсультироваться с врачом.

Случаев зависимости от препарата не описано.

### **Дети и подростки**

Не применяйте препарат Гепарин у детей и подростков в возрасте до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность не установлены.

### **Другие препараты и препарат Гепарин**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

С осторожностью применяйте препарат Гепарин на обширных поверхностях тела или при приеме пероральных антикоагулянтов (препараты для профилактики возникновения тромбов, например, ацетилсалициловая кислота), так как при совместном приеме может повышаться риск кровотечений.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Данные о применении препарата в период беременности и лактации отсутствуют.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Гепарин не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.


### **Препарат Гепарин содержит пропиленгликоль, этанол, диметилсульфоксид, метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат**

Гепарин гель содержит пропиленгликоль. Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи. Не применяйте данный лекарственный препарат на открытых ранах или больших площадях поврежденной или пораженной кожи (например, после ожогов) без консультации лечащего врача или работника аптеки.

Данный лекарственный препарат содержит 240,0 мг этилового спирта 96% в 1 г. Может вызывать чувство жжения на поврежденной коже.

Гепарин гель содержит диметилсульфоксид, который может раздражать кожу, а также метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызывать аллергические реакции (возможно отсроченные).

### **3. Применение препарата Гепарин**



Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза**

Полосу геля размером от 3 до 10 см нанесите на пораженный участок и осторожно втирайте. Используйте препарат от одного до трех раз в сутки.

Продолжительность терапии определяется врачом и зависит от тяжести и прогрессирования заболевания. Не следует использовать препарат более 14 дней, если иное не назначено врачом.

#### **Путь и (или) способ введения**

Препарат применяют наружно.

#### **Применение у детей и подростков**

Применение у детей и подростков до 18 лет не рекомендуется в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности.

#### **Если Вы применили препарата Гепарин больше, чем следовало**

Если вы нанесли препарата больше, чем следовало, удалите его салфеткой и/или смойте его с кожи. О случаях передозировки при местном применении не сообщалось.

#### **Если Вы забыли применить препарат Гепарин**

Если Вы забыли применить дозу препарата, сделайте это, как только вспомните. Не применяйте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата могут возникнуть следующие нежелательные реакции:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): местные аллергические реакции, такие как покраснение кожи и зуд.

**При возникновении у Вас описанных выше симптомов, немедленно прекратите применение препарата и обратитесь к врачу или работнику аптеки.**

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь


УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29; факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

Сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: <https://www.rceth.by/>



#### **5. Хранение препарата Гепарин**

Храните препарат в недоступном для детей месте.

1681Б-2017

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

##### **Препарат Гепарин содержит**

Действующим веществом является гепарин натрия.

1 г препарата Гепарин содержит 1000 МЕ гепарина натрия.

Прочими вспомогательными веществами являются: карбомер, пропиленгликоль, этиловый спирт 96%, диметилсульфоксид, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, диэтаноламин, лавандовое масло, вода очищенная.

Препарат Гепарин содержит пропиленгликоль, этиловый спирт 96 %, диметилсульфоксид, метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат (см. раздел 2).

##### **Внешний вид препарата Гепарин и содержимое упаковки**

Гель для наружного применения.

Однородный бесцветный или с желтоватым оттенком, прозрачный или почти прозрачный гель с ароматным запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха.

По 30 г в тубах из комбинированного материала с бушонами или в тубах из полимерных материалов. Каждая туба вместе с листком-вкладышем помещена в пачку из картона.

##### **Категория отпуска лекарственного препарата**

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

##### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Республика Беларусь

ООО «Фармтехнология»

220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22

Телефон/факс: (017) 309 44 88

E-mail: ft@ft.by

За любой информацией о препарате, а также о случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

##### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) <https://www.rceth.by/>

