

1342Б-2019



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА, настойка**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА
3. Применение препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА,
и для чего его применяют**

ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА является средством растительного происхождения. Биологически активные вещества, содержащиеся в траве пустырника, оказывают седативное, умеренное гипотензивное и кардиотоническое действие. Применяется в комплексной терапии функциональных нарушений нервной системы (неврастения и нарушения сна); в комплексной терапии функциональных нарушений сердечной деятельности.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА**

Препарат ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА противопоказан:

- при гиперчувствительности на компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, обострении эрозивного гастрита;
- при артериальной гипотензии;
- при брадикардии;
- при беременности и в период грудного вскармливания;
- детям до 12 лет.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите лечащему врачу перед началом приема препарата.

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед началом приема препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА содержит этанол!

Данный лекарственный препарат содержит не менее 64,0 % (об/об) этанола, что соответствует от 388,6 мг до 582,8 мг на разовую дозу (20-30 капель), что эквивалентно от 9,8 мл до 14,8 мл пива или от 4,1 мл до 6,2 мл вина на дозу.

Вреден для лиц с алкоголизмом.

Сообщите лечащему врачу **перед началом лечения** препаратом ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА о следующих нарушениях или заболеваниях:

- заболевания печени; эпилепсия; алкоголизм; черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога.

Сообщите врачу, если во время лечения у вас:

- симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния.

Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышки).

Дети и подростки

Противопоказано применение у детей младше 12 лет. Следует соблюдать осторожность при применении у детей старше 12 лет.

Другие препараты и препарат ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без назначения врача.

Препарат ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА может усиливать эффекты снотворных и успокоительных (седативных) средств.

Препарат содержит этанол. Необходимо избегать совместного приема с препаратами, вызывающими дисульфирамоподобную реакцию при приеме с алкоголем (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия):

- дисульфирам (препарат для лечения алкоголизма);
- антибиотики (цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол);
- препараты, снижающие уровень сахара в крови (хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид);
- противогрибковые препараты (гризофульвин, кетоконазол);
- противомикробные препараты, производные нитро-5-имида (например, метронидазол, орнидазол, тинидазол);
- прокарбазин (противоопухолевый препарат).

Необходимо также избегать совместного приема с лекарственными препаратами, угнетающими функции центральной нервной системы.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этанол.

Прием препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА с пищей, напитками и алкоголем
Препарат ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА следует принимать до еды. В период лечения следует избегать употребления алкоголя и алкогольсодержащих напитков.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Противопоказано применение препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА во время беременности и в период грудного вскармливания. Трава пустырника способна повышать тонус матки и влиять на менструальный цикл.

Если вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с вашим врачом, прежде чем принимать данный препарат.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА содержит этиловый спирт. В период лечения откажитесь от управления транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Режим дозирования и длительность лечения устанавливается индивидуально в зависимости от состояния и возраста, переносимости лекарственного средства и достигнутого лечебного эффекта.

1 мл настойки содержит 26 капель.

Обычная доза для взрослых – по 20-30 капель 3 раза в сутки. Внутрь, до еды.

Рекомендуемую дозу капель разводят в 1/4 стакана воды.

Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени из-за содержания этилового спирта. Во время лечения необходимо избегать приема других этиловодородсодержащих препаратов.

Применение у детей и подростков

ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА применяется у детей старше 12 лет по 10-15 капель 3 раза в сутки до еды. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной.

Если вы приняли больше, чем назначено

Если вы приняли больше назначенной дозы препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА, возможно появление утомляемости, сонливости, головокружения, снижения артериального давления. Следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка.

Если вы забыли принять препарат ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА

Не следует принимать двойную дозу (две дозы в одно время), чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примите следующую дозу в обычное время.

Если вы прекратите прием препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА

Обратитесь за консультацией к лечащему врачу, если вы хотите прекратить прием препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА раньше, чем рекомендовано.

Если у вас есть любые дополнительные вопросы об использовании этого лекарственного средства, обратитесь к своему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата возможно развитие следующих нежелательных реакций:

- аллергические реакции;
- утомляемость, сонливость;
- головокружение;
- снижение артериального давления.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с

СОГЛАСОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Беречь от огня.

Срок годности – 3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывать препарат в канализацию. Уточнить у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на один флакон 30 мл:

Активный компонент: пустырника трава – 6 г; *вспомогательное вещество:* этанол (этиловый спирт) 70 % – до 30 мл настойки.

Состав на один флакон 50 мл:

Активный компонент: пустырника трава – 10 г; *вспомогательное вещество:* этанол (этиловый спирт) 70 % – до 50 мл настойки.

Внешний вид препарата ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА и содержимое упаковки
 ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА представляет собой прозрачную жидкость зеленоватобурого цвета, слабо ароматного запаха. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из светозащитного стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками навинчивающимися.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из светозащитного стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками укупорочно – навинчивающимися с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон с этикеткой самоклеящейся вместе с листком - вкладышем помещен в пачку из картона. Флаконы с этикеткой многостраничной помещены в ящики из гофрированного картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: