

**ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата**

ЗЕЛЕНИНА КАПЛИ

Регистрационный номер

Торговое наименование

Зеленина капли

Международное непатентованное или группировочное наименование

Белладонны листьев настойка+Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка+Ландыша травы настойка+[Левоментол]

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Состав на 100 мл:

Белладонны листьев настойки (красавки настойки)	- 20 мл
Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойки (валерианы настойка)	- 40 мл
Ландыша травы настойки (ландыша настойки)	- 40 мл
L-ментола	- 0,8 г

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого или желто-коричневого цвета характерного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Седативное средство.

Код АТХ N05CM

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат.

Красавки настойка оказывает м-холиноблокирующее и спазмолитическое действие. Препятствует стимулирующему действию ацетилхолина; уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных, потовых желез, поджелудочной железы. Снижает тонус мышц желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), желчных протоков и желчного пузыря; вызывает тахикардию, улучшает атриовентрикулярную (AV) проводимость. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации.

Валерианы настойка обладает седативным и спазмолитическим действием. Облегчает наступление естественного сна. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабилен. Оказывает желчегонное действие, увеличивает секрецию слизистой оболочки ЖКТ, замедляет сердечный ритм, расширяет коронарные сосуды. Действие на деятельность миокарда опосредовано через нейрорегуляторные механизмы и прямое влияние на автоматизм и проводящую систему сердца.

Ландыша настойка оказывает кардиотоническое действие.

L-ментол – местнораздражающее средство, оказывает вентонизирующее, анальгезирующее, рефлекторное коронародилатирующее и антиангинальное действие.

Показания к применению

В качестве успокаивающего средства при вегето-сосудистой дистонии, повышенной нервной возбудимости, комплексной терапии хронической сердечной недостаточности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы с нарушением оттока мочи, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, выраженный кардиосклероз, эндокардит, миокардит, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано, т.к. отсутствуют данные о применении препарата во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Доза устанавливается индивидуально.

Взрослым назначают внутрь по 20-25 капель 2-3 раза в день. Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, аритмии, мышечная слабость, головная боль, изжога, гастралгия, тошнота, рвота, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта, парез аккомодации, задержка мочи у больных с увеличенной предстательной железой.

Передозировка

Симптомы: кожная сыпь (аспе bromica).

Лечение: прекращение приема, введение больших количеств (при отсутствии противопоказаний) натрия хлорида – 10-20 г в сутки (ускоряет выведение брома), обильное питье (3-5 л в сутки), салуретики.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Усиливает действие снотворных, седативных и спазмолитических средств.

Особые указания

В максимальной суточной дозе препарат содержит 0,7 г абсолютного спирта.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Следует воздержаться от управления автотранспортом и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь. По 25 мл во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ, укупоренных пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми;

или по 25 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укупоренных пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми;

или по 25 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укупоренных пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми с защитой или без защиты от детей, с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия. Каждый флакон или флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Упаковка для стационаров. По 54 или 70 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку. По 9 кг или 18 кг в канистрах полимерных из полиэтилена низкого давления с навинчивающимися крышками с предохранительным кольцом.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения, производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Россия, 150030, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5, тел/факс (4852) 44-38-56

Директор ЗАО «ЯФФ»



С.П. Атмашкин