

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**АНТИ-П
Спрей для наружного применения**

Описание: прозрачная жидкость, красновато-бурого цвета, с характерным запахом. При хранении допускается выпадение незначительного осадка.

Состав для флакона 50 мл

Действующих веществ:

Чемерицы корневищ с корнями	- 3,5 г
Пихтового масла	- 0,0125 г
Дегтя березового	- 0,002 г

Вспомогательного вещества: спирта этилового разведенного 70 %.

Форма выпуска: спрей для наружного применения.

Свойства

Биологические активные вещества корневищ с корнями чемерицы оказывают педикулоцидное и овицидное (вызывающего гибель гнид) действие, пихтовое масло оказывает противовоспалительное действие на кожный покров головы, а деготь березовый оказывает антисептическое, противозудное и смягчающее действие на кожу.

Механизм действия.

После однократной обработки вызывает гибель вшей на всех стадиях развития, в том числе и гнид.

Показания к применению

Головной и лобковый педикулез (фтириаз).

Способ применения и дозировка

Наружно.

Перед применением снимают крышку флакона и навинчивают распылительную насадку. Флакон держат строго вертикально. Для заполнения насадки делают 3-5 нажатий на головку распылителя, направив струю на лист бумаги. Затем свободный конец распылительной насадки направляют на волосяную часть головы или на лобковую область.

При головном педикулезе препарат в неразведенном виде применяют однократно на волосяной покров головы, делая акцент на корни. Норма расхода препарата в зависимости от степени зараженности насекомыми, длины волос составляет 20–50 мл, время экспозиции 20-30 мин. Для удаления гнид волосы после обработки следует мыть шампунем и прополоскать теплым 3-5% раствором столового уксуса или 5-10% раствором уксусной кислоты.

Погибших вшей вычесывают частым гребнем на клеенку или бумагу, которые затем сжигают. Гребень необходимо тщательно промыть горячей водой или протереть спиртом, или поместить на 30 минут в 5-10% раствор уксусной кислоты.

Препарат применяют однократно, при недостаточном овицидном действии обработку препаратом необходимо повторить через 7–10 дней.

При фтириазе сначала бреют волосы на лобке и промежности. Затем раствором препарата обрабатывают кожу лобковой зоны, оставляют на 30 минут, а затем препарат смывают теплой водой с мылом.

Побочное действие

При гиперчувствительности возможны кожные аллергические реакции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детям до 5 лет, беременным, кормящим грудью матерям.

Не рекомендуется больным с сопутствующей экземой, атопическим дерматитом из-за усиленной резорбции препарата и возможного обострения основного заболевания.

Передозировка

Симптомы: неприятный привкус во рту, общая слабость, тошнота, рвота и замедление пульса - первые признаки отравления.

Длительный контакт с препаратом или вдыхание его паров могут привести как к местному, так и системному токсическому действию - возбуждение М- и Н-холинорецепторов с нарушением зрения, появлением слезотечения, гиперсаливации, потливости, бради- или тахикардии, мышечных подергиваний, судорог, кишечных коликов, дыхательных расстройств, цианоза, недержания мочи.

Лечение: симптоматическое лечение и назначают диазепам и атропин.

Меры предосторожности

Следует избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. При попадании препарата на слизистые оболочки, их необходимо тщательно промыть под струей воды.

При случайном приеме препарата внутрь немедленно промыть желудок большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу.

После нанесения препарата необходимо вымыть руки теплой водой с мылом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан при беременности. Кормящие женщины на время лечения должны приостановить грудное вскармливание.

Взаимодействие с другими средствами

Не выявлены.

Условия и сроки хранения

В защищенном от влаги и света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка: по 50 мл в полимерных флаконах коричневого цвета в комплекте с распылительной насадкой.

Изготовитель:

ООО «ДЕПОФАРМ»

Республика Молдова, 6531, Новоаненский район, р-н Анений Ной, с. Русень.

Изготовитель, осуществляющий упаковку и принимающий претензии от потребителя:

ЗАО «ИНТЕГРАФАРМ»

223045, Минская область, Минский р-н, Юзуфовский с/с, 8-5, р-н а\г Юзуфово.

тел. + 375 17 504 22 60

e-mail: commercial@integrafarm.by

Предъявляйте любые жалобы и пожелания вместе с номером серии, указанной на упаковке.