

17 02. 2016 112
КЛС №1 от 28.01.2016

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

ШАЛФЕЯ ЛИСТЯ
SALVIAE FOLIA

Регистрационный номер _____

Форма выпуска

Измельченное сырье.

Общая характеристика

Кусочки листьев, стеблей и небольшого количества цветков различной формы. Цвет зеленый, серовато-зеленый или серовато-белый с фиолетово-коричневыми, желтовато-белыми, белыми и редкими сине-фиолетовыми краплениями. Запах сильный, своеобразный, особенно при растирании.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, вяжущее, противомикробное действие. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Показания к применению

Местно: симптоматическое лечение воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Наружно: симптоматическое лечение легких воспалительных заболеваний кожи.

Противопоказания

Гиперчувствительность, бронхиальная астма. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозировка

5 г (1 столовая ложка) измельченных листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Применяют местно для полосканий полости рта и глотки по 1/2-1 стакану водного извлечения (в теплом виде) 2-4 раза в день.

Применяют наружно для примочек, орошений.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие

Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Не рекомендуется применять водные извлечения листьев шалфея длительно (местно – более 1 недели, наружно – более 2 недель).

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение при беременности и лактации. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендовано. Туйон, входящий в состав листьев шалфея, может оказать неблагоприятное влияние на течение беременности.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Прием лекарственного средства внутрь может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. При случайном приеме внутрь пациентам не рекомендовано управлять автомобилем или работать с техникой.

Применение у детей. В связи с отсутствием данных не рекомендуется детям до 18 лет.

Передозировка

Передозировка после приема внутрь более 15 г листьев шалфея может проявляться ощущением жара, развитием тахикардии, головокружения и эпилептических судорог. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Прием препаратов шалфея внутрь может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через ГАМК-рецепторы (например, барбитураты, бензодиазепины). Одновременно применение с данными лекарственными средствами не рекомендовано. Препараты шалфея могут взаимодействовать с гипогликемическими и противосудорожными средствами, усиливать седативное действие других лекарственных средств и алкоголя. Лекарственное средство может повлиять на всасывание железа и других минералов.

Условия и сроки хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Приготовленный настой – в прохладном месте не более 2 суток при температуре (8-15) °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 1,5 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 50 г в пакете бумажном в пачке. Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.