

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Фукорцин

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Фукорцин.

МНН: ~

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Состав: действующие вещества: борная кислота - 0,8 г, краситель фуксин основной - 0,4 г, фенол - 3,9 г, резорцинол - 7,8 г; вспомогательные вещества: ацетон - 4,9 г, этанол 95 % - 9,6 мл, вода очищенная до 100 мл.

Описание: жидкость темно-красного цвета с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.

Код АТХ: D08AD.

Фармакологические свойства

Обладает антисептическим и противогрибковым действием.

Показания

Гнойничковые и грибковые заболевания кожи, поверхностные раны, эрозии, трещины, ссадины кожи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применять женщинам в периоды беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно. Раствор наносят с помощью тампона или стеклянной палочки на пораженный участки кожи 2-4 раз в день. После высыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене - нет сведений. Указание возможности и особенностей медицинского применения лекарственного препарата, детьми, взрослыми, имеющими хронические заболевания - нет сведений.

Побочное действие

Местные реакции; возможно (особенно у детей) ощущение жжения и боли, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.

Передозировка

При длительном использовании фукорцина и использовании его на обширных участках кожи возможна передозировка препарата, что сопровождается явлениями, характерными для отравления фенолом (головокружением, слабостью, нарушением дыхания). В случае возникновения таких явлений необходимо дать больному доступ свежего воздуха, провести симптоматическое лечение.

Взаимодействие с лекарственными препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами неизвестно.

Особые указания

Не следует наносить препарат на большие участки кожи, так как фенол, входящий в состав препарата, может проникать в кровь и вызывать токсические явления (головокружение, слабость). Препарат имеет своеобразный запах и красный цвет и может пачкать белье.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Нет сведений.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения:

По 10, 15 или 25 мл во флаконы оранжевого стекла с помазком или без помазка или по 10, 15, 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную или запаивают в полиэтиленовый пакет.

Допускается упаковка флаконов вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (коробку картонную).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии:

ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86
Тел.\факс (846) 373-81-07.

Производитель

ОАО «Самарамедпром» 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.99 б.

Тел.\факс (846) 373-81-08.

ОАО «Самарамедпром», 446246, Самарская обл., Волжский район, пос.г.т. Петра Дубрава, территория завода «Коммунар», литер Б, Б1, здание № 2. (846) 373-81-08.

Генеральный директор

ОАО «Самарамедпром»

Н.Л. Стышнева

