

Листок-вкладыш: информация для пациента

Пиносол® , капли назальные

Действующие вещества: альфа-токоферола ацетат, мяты перечной листьев масло, сосны обыкновенной масло, тимол, эвкалипта листьев масло.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Пиносол® и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Пиносол®.
3. Применение препарата Пиносол®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Пиносол®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Пиносол®, и для чего его применяют

Препарат Пиносол® содержит в качестве действующих веществ альфа-токоферола ацетат (витамин E), мяты перечной листьев масло, сосны обыкновенной масло, тимол, эвкалипта листьев масло оказывает противовоспалительное и антисептическое действие и относится к группе препаратов, применяемых для лечения заболеваний носа.

Показания к применению

Препарат Пиносол® применяют у взрослых и детей в возрасте от 2 лет до 18 лет по следующим показаниям:

- Острый ринит.
- Хронический атрофический ринит.

- Острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью слизистых оболочек носа.
- Состояния после хирургического вмешательства в полости носа – по назначению врача (в условиях стационара и амбулаторно).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Пиносол®

Противопоказания

Не применяйте препарат Пиносол®:

Если у Вас аллергия на действующие вещества или любые другие компоненты препарата (перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша), если у Вас аллергический ринит.

Не давайте препарат детям младше 2 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Пиносол® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Стоит избегать попадания препарата Пиносол® на слизистую оболочку глаз.

Частое и/или длительное применение лекарственного препарата может привести к сухости слизистой оболочки носа.

Дети и подростки

Не давайте препарат Пиносол® детям в возрасте от 0 до 2 лет, так как эффективность и безопасность применения препарата у данной группы не установлены.

Другие препараты и препарат Пиносол®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

В настоящее время данные по взаимодействию с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

В период беременности применение препарата возможно после консультации с врачом и при условии соблюдения рекомендованного врачом режима дозирования.

Грудное вскармливание

В период грудного вскармливания применение препарата возможно после консультации с врачом и при условии соблюдения рекомендованного врачом режима дозирования.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Пиносол® не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Пиносол® содержит бутилгидроксианизол.

Бутилгидроксианизол может вызывать местные реакции (например, контактный дерматит), или раздражение глаз или слизистых оболочек.

3. Применение препарата Пиносол®

Всегда применяйте Пиносол® в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослым препарат закапывают в первый день по 1–2 капли в каждый носовой ход с интервалами в 1–2 часа, в последующие дни – по 1–2 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки.

Применение у детей и подростков

Детям в возрасте от 2 до 18 лет закапывают по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки или вводят препарат, используя ватный тампон.

Путь и (или) способ введения

Препарат Пиносол® предназначен для местного применения.

Возможно ингаляционное применение – для этого 2 мл (50 капель) препарата закапывают в ингалятор. Ингаляции рекомендуется проводить 2–3 раза в сутки.

Продолжительность лечения

Длительность лечения составляет 5-7 дней.

Если Вы применили препарата Пиносол® больше, чем следовало

Если Вы применили препарата Пиносол® больше, чем следовало, обратитесь к лечащему врачу, так как это может привести к усилению побочных эффектов.

Если Вы забыли применить препарат Пиносол®

Не применяйте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Пиносол®

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- дискомфорт в месте введения (зуд, жжение, сухость, покраснение или отек слизистой оболочки носа)
- дискомфорт в носу
- аллергические реакции к лекарственному препарату

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Российская Федерация, 109012, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Интернет-сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, д. 13

Телефон: +7 7172 235 135

Электронная почта: pdlc@dari.kz

Интернет-сайт: <http://www.ndda.kz>

5. Хранение препарата Пиносол®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не ниже 15 °С и не выше 25 °С в оригинальной упаковке (флакон в пачке картонной) для того, чтобы защитить от света.

Не выбрасывайте препараты в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Пиносол® содержит

Действующие вещества: альфа-токоферола ацетат, мяты перечной листьев масло, сосны обыкновенной масло, тимол, эвкалипта листьев масло.

Прочими вспомогательными веществами являются:

Бутилгидроксанизол, масло растительное, макрогола и глицеридов абрикосового масла эфиры (лабрафил М-1944-CS), гвайазулен.

Внешний вид препарата Пиносол®

Капли назальные. Прозрачная жидкость от синего до зелено-синего цвета с ментолово-эвкалиптовым запахом.

По 10 мл во флаконах из коричневого стекла, снабженных резиновой пипеткой с крышкой.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещен в картонную пачку.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «Опелла Хелскеа»

Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 22

Производитель

Словацкая Республика

«Санека Фармасьютикалс а.с.» / Saneka Pharmaceuticals a.s.

Словацкая Республика, 920 27 Глоговец, Нитрянска 100 / Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovak Republic

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация:

ООО «Опелла Хелскеа»

Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 22

Телефон: +7 495 721-14-00

Республика Казахстан:

ТОО «STADA Kazakhstan»

Республика Казахстан, 050044, г. Алматы, ул. Нұрлан Қаппаров, д. 408

Тел.: +7 727 2222 100

Электронная почта: PVEurasia@stada.kz

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Евразийского экономического союза: <http://eec.eaeunion.org/>