

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
АНУЗОЛ

Регистрационный номер: P N000279/01

Торговое наименование: Анузол

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Белладонны листьев экстракт + Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс + Цинка сульфат

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий.

*Действующие вещества:*

Трибромфенолята висмута  
и висмута оксида комплекс (ксероформ) - 100,0 мг

Белладонны листьев экстракт  
(Красавки экстракт густой) - 20,0 мг

Цинка сульфат - 50,0 мг

*Вспомогательные вещества:*

Глицерол - 120,0 мг

Полисорбат 80 (твин 80) - 11,0 мг

Эмульгатор Т2 - 110,0 мг

Жир твердый (Керносол 35) - 1789,0 мг

**Описание:** Суппозитории зеленовато-желтого, зеленовато-желтого с коричневатым оттенком или светло-коричневого цвета с характерным запахом, торпедообразной формы.

**Примечание.** При хранении допускается появление едва заметного белого налета на поверхности суппозитория.

**Фармакотерапевтическая группа:** геморроя средство лечения.

**Код АТХ:** [C05AX03]

**Фармакологические свойства**

Противогеморроидальное комбинированное средство. Обладает болеутоляющим, местным противовоспалительным, спазмолитическим, антисептическим, вяжущим и подсушивающим действием.

**Показания к применению**

Геморрой, анальные трещины.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, обструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта, атония кишечника, активный язвенный колит, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, тахикардия, миастения, закрытоугольная глаукома, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

**С осторожностью**

Вегетативная нейропатия, гипертиреоз, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, митральный стеноз, заболевания почек, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит, повышение температуры тела (вероятность развития лихорадки и теплового удара вследствие подавления активности потовых желез).

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. В случае необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

**Способ применения и дозы**

Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника. Применять по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки.

Максимальная суточная доза - 7 суппозитория. Обычно длительность курса лечения составляет 7-10 дней.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, жжение в области заднего прохода, сухость во рту, запор, послабление стула, ощущение сердцебиения, расширение зрачков, преходящие нарушения зрения (парез аккомодации), головная боль, головокружение, нарушение сна, сонливость, тахикардия, светобоязнь, задержка мочеиспускания.

### **Передозировка**

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов, тошнота, рвота, снижение потоотделения, гипертермия; в более тяжелых случаях – психомоторное возбуждение, судороги, острая задержка мочеиспускания. В случае передозировки применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу. Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами возможно усиление м-холинблолирующих эффектов препарата (сухость во рту, нарушение аккомодации, тахикардия, запор и т.д.). При применении с препаратами, повышающими частоту сердечных сокращений (в том числе прокаиномид) – возможна выраженная тахикардия. Ингибиторы МАО повышают риск развития побочных эффектов и усиливают положительный хроно- и батмотропный эффект; при совместном применении с сердечными гликозидами – усиление положительного батмотропного эффекта. При одновременном приеме с препаратами красавки (белладонны) этанола (алкоголя) возможно усиление тормозящего действия на центральную нервную систему (ЦНС).

### **Особые указания**

Следует учитывать возможное проникновение алкалоидов красавки (белладонны) через гематоэнцефалический барьер и возможное взаимодействие с лекарственными средствами, влияющими на ЦНС. В терапевтических дозах алкалоиды красавки (белладонны) оказывают умеренное стимулирующее влияние на ЦНС, в больших дозах – возбуждающее действие, в токсических дозах – агитацию, галлюцинации, сменяющиеся торможением и коматозным состоянием. Следует избегать одновременного назначения препарата и других лекарственных средств с антихолинергической активностью, поскольку повышается вероятность развития побочных эффектов. Красавки (белладонны) экстракт способствует снижению скорости всасывания совместно применяемых лекарственных средств вследствие угнетения моторной функции желудочно-кишечного тракта.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные.

По 5 суппозиторий помещают в контурную ячеиковую упаковку из пленки поливинилхлоридной.

По 2 контурные ячеиковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

### **Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей**

ИАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4,  
телефон/факс (8412) 57-72-49.

00700-0005-07

