

АТРОПИН ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ВР 1%

Состав: м/о

Атропин сульфат ВР 1%

Хлоробутанол ВР 0.5%

(как консервант)

Водная основа достаточное количество (q.s.)

Фармакология:

Глазные капли атропин обладают парасимпатолитическим действием, которое включает паралич аккомодации глаза и расширение зрачка.

Показания и использование:

В качестве циклоплегического или мидриатического средства при рефракции или для желаемого расширения радужной оболочки или увеального тракта во время острых воспалительных состояний.

Дозировка и администрирование:

Взрослые:

Воспаление глаз (увеит/ирит): закапывать в глаз(а) по 1 или 2 капли максимум 4 раза в день.

Заболевание глаз, которое может вызвать нечеткость зрения (рефракцию): закапать 1 или 2 капли в глаз(а) за час до обследования.

Дети:

Воспаление глаз (увеит/ирит): по 1 капле в каждый глаз, максимум 3 раза в день. Заболевания глаз, которые могут вызвать нечеткость зрения (рефракцию): по 1 капле в каждый глаз два раза в день за 1-3 дня до обследования

Противопоказания:

Не применять при глаукоме или склонности к глаукоме, а также у лиц с повышенной чувствительностью к алкалоидам белладонны. Не следует использовать детям в возрасте до шести лет.

Предупреждения и меры предосторожности:

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ. Используйте раствор в течение одного месяца после открытия флакона.

Его следует применять с осторожностью у пациентов, у которых возможно повышенное внутриглазное давление.

Пациентов следует предупредить, что антиму斯卡риновые глазные капли временно ухудшают зрение.

Побочные эффекты:

У пациентов может возникнуть светобоязнь, поэтому глаза следует защищать от яркого света, пока зрачки расширены.

Длительное применение глазных капель с атропином может привести к местному раздражению, преходящему жжению, гиперемии, отеку и конъюнктивиту. Может наблюдаться повышение внутриглазного давления, особенно у пациентов с закрытоугольной глаукомой.

Гиперчувствительность к атропину не является редкостью и может проявляться в виде кожной сыпи или конъюнктивита.

Закапывание глазных капель может вызвать системную токсичность, особенно у младенцев и пожилых людей. Сообщаемые симптомы включают тяжелую атаксию, беспокойство, возбуждение и галлюцинации.

Другие побочные эффекты могут включать сухость во рту с затруднением глотания и разговора, гиперемию и сухость кожи, преходящую брадикардию с последующей тахикардией, сердцебиение и аритмии, снижение секреции бронхов, позывы к мочеиспусканию, задержку и запор.

Хранение:

Хранить в прохладном и темном месте. Не замораживать.

Упаковка:

Стерильный пластиковый флакон.

Производственная лицензия No.G/476

Произведено в Индии:

**SUNWAYS ROHTO
PHARMACEUTICAL
PVT.LTD.**

803/4/5, GIDC, Дхолка,
Ахмадабад-382 225.