

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ОКСОЛИН

Регистрационный номер: ЛП-007346

Торговое наименование: ОКСОЛИН

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Диоксотетрагидрокситетрагидрофталин

Лекарственная форма: мазь назальная

Состав

100 г мази содержит:

Действующее вещество:

Диоксотетрагидрокситетрагидрофталин (оксолин) - 0,25 г

Вспомогательные вещества:

Парафин жидкий - 0,5 г

Вазелин - до 100 г

Описание:

Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа:

Противовирусное средство для местного применения.

Код ATX: J05AX

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20 % препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания к применению:

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к диоксотетрагидрокситетрагидрофталину и другим компонентам препарата.

С осторожностью:

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до двух лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы:

Местно.

Для профилактики гриппа: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа [на протяжении 25 дней] или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа

2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

Быстро проходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. В редких случаях возможны синее охрашивание слизистой оболочки носа.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Не изучано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Применение препарата не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска:

Мазь назальная 0,25%.

По 10, 15, 25 г в тубы алюминиевые укупоренные колпачками полизтиленовыми или в тубы алюминиевые укупоренные колпачками-башонками полизтиленовыми.

По 10, 15, 25 г в банки стеклянные для лекарственных средств или в банки стеклянные из кирпичного стекла укупоренные крышками полизтиленовыми натягиваемыми.

На банки наклеиваются этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или этикетки из бумаги самоклеющейся.

Каждую тубу, банку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац.

Условия хранения:

При температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ», Россия, 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 25, офис 5 этаж.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08

Производитель:

ОАО «Самарамедпром», Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99б.