


НД РБ

30235-2022



**Листок-вкладыш – информация для пациента
ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД,
раствор для внутреннего применения 100 мг/мл
Действующее вещество: цитиколин**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД
3. Применение препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД,
и для чего его применяют**

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД относится к группе препаратов, которые называются психостимуляторами и ноотропами и улучшают работу мозга.

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД используется для лечения нарушений, вызванных:

- нарушением мозгового кровообращения (вследствие образования кровяного сгустка или разрыва кровеносного сосуда);
- травмой головы.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД**

Не принимайте ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД, если:

- у вас аллергия на цитиколин или любой другой компонент препарата, указанный в разделе 6;
- если вы страдаете повышенным тонусом парасимпатической нервной системы (серьезное состояние, которое характеризуется низким артериальным давлением, потоотделением, учащенным сердцебиением и обмороком).

Если вы не уверены, относится ли к вам что-либо из выше перечисленного, сообщите лечащему врачу перед применением препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД.

Другие препараты и ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится и к любым препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД усиливает действие леводопы (L-дофа, средство для лечения болезни Паркинсона).

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД не следует принимать одновременно с препаратами, содержащими меклофеноксат (ноотропное средство, которое стимулирует деятельность мозга).

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД с пищей и напитками

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД можно принимать независимо от приема пищи.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом перед началом применения препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД. Врач примет решение, можно ли вам принимать ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД во время беременности.

При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания, на время лечения грудное вскармливание следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Некоторые нежелательные реакции, которые могут возникать при приеме препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД, могут влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Важная информация о некоторых компонентах препарата

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД содержит сорбитол. Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу до начала приема данного препарата.

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД содержит глицерин, который может вызывать головную боль, расстройство желудка и диарею (понос).

Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, входящие в состав препарата, могут вызывать аллергические реакции (в том числе, отсроченные).

3. Применение препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с врачом.

Режим дозирования

Рекомендуемая доза препарата составляет от 500 мг (5 мл) до 2000 мг (20 мл) в сутки и зависит от тяжести вашего заболевания.

Применение у детей и подростков

Применение цитиколина у детей недостаточно изучено. Врач примет решение о возможности назначения препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД вашему ребенку.

Способ применения

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД предназначен для приема внутрь. Для обеспечения точного дозирования необходимо использовать шприц-дозатор 2 мл или стакан дозирующий вместимостью 20 мл.

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД можно принимать внутрь без разведения или предварительно развести его в половине стакана воды (120 мл) комнатной температуры.

В случае разведения приготовленный раствор хранению не подлежит и должен быть принят сразу после приготовления.


После каждого применения рекомендуется промыть шприц-дозатор или стакан дозирующий водой.

Алгоритм применения препарата при помощи шприца-дозатора

1. Поместите шприц-дозатор с полностью опущенным поршнем во флакон.
2. Вытягивая поршень, наберите необходимую дозу препарата, руководствуясь шкалой шприца-дозатора.
3. Примите раствор внутрь без разведения или предварительно разведите его как описано выше.

Алгоритм применения препарата при помощи стакана дозирующего

1. Налейте в дозирующий стакан из флакона необходимую дозу препарата, руководствуясь шкалой на стакане.



2. Примите раствор внутрь без разведения или предварительно **разведите его как описано** выше.

Если во время применения лекарственного препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Если вы приняли препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД больше, чем следовало

О случаях передозировки цитиколином не сообщалось. Однако если вам кажется, что вы приняли слишком высокую дозу препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД, обратитесь к врачу.

Если вы пропустили прием препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД

Если вы пропустили прием препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД, примите его, как только вспомните об этом. Однако если уже наступило время приема следующей дозы, опустите прием пропущенной дозы и продолжайте принимать препарат как обычно.

Не принимайте двойную дозу (две дозы одновременно), чтобы компенсировать пропущенную.

Если вы досрочно прекращаете применение препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД

Решение о необходимой продолжительности лечения примет ваш врач. Не прекращайте принимать ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД без рекомендации врача.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нежелательные реакции при приеме препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД возникают очень редко (могут проявляться менее чем у 1 из 10 000 человек) и могут быть следующими:

- аллергические реакции, в т.ч. немедленного типа (симптомы включают резкое снижение давления, сыпь на коже, отечность, красноту, затруднение дыхания);
- галлюцинации;
- головная боль, головокружение;
- повышение либо понижения кровяного давления;
- одышка;
- тошнота, рвота, иногда диарея;
- покраснение кожи, крапивница, сыпь, сыпь кровоизлияниями на коже и слизистых;
- озноб, отек.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», www.rceth.by).

Кроме того, информацию о выявленных нежелательных реакциях вы можете предоставить в адрес держателя регистрационного удостоверения – РУП «Белмедпрепараты»:

- по телефонам +375-44-781-06-00 либо +375-17-222-78-38;

- посредством электронной почты pharmacovigilance@belmedpreparaty.com.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить препарат в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Срок годности после вскрытия флакона – 3 месяца.



Не использовать по истечении срока годности.

Не выбрасывайте остатки препарата в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 мл раствора содержит *действующее вещество*: цитиколин (в виде цитиколина натрия) – 100 мг.

Вспомогательные вещества: сорбитол E420, глицерин E422, метилпарагидроксибензоат E218, пропилпарагидроксибензоат E217, натрия цитрат дигидрат, сахарин натрия, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат (в виде 50% раствора), вода очищенная.

Внешний вид препарата ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД и содержимое упаковки

ЦИТИКОЛИН-БЕЛМЕД, раствор для внутреннего применения 100 мг/мл, – прозрачная, бесцветная или с желтоватым или с желтовато-коричневым оттенком жидкость.

По 30 мл, 50 мл лекарственного препарата во флаконы с винтовой горловиной из коричневого светозащитного стекла номинальной вместимостью 30 мл, 50 мл. Флаконы укупоривают крышками укупорочно-навинчиваемыми с контролем первого вскрытия. На каждый флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся.

Флакон в комплекте со шприцем-дозатором 2 мл или стаканом дозирующим вместимостью 20 мл и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: по рецепту врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com

