

Инструкция по применению

Биологически активная добавка к пище
«Регидол»
порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Дополнительный источник калия

Для восполнения потерь жидкости, солей, восстановления водно-солевого баланса. При состояниях, связанных с потерей жидкости и солей, при повышенном потоотделении в период физических нагрузок, длительном пребывании на солнце, повышении температуры окружающей среды. Предназначен только для внутреннего применения. Регидол порошок нельзя растворять в других жидкостях, кроме питьевой воды.

Не является лекарственным средством.

Состав: Натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, глюкоза, ромашки сухой экстракт.

Один пакетик содержит:
натрия хлорида – 0,52 г;
калия хлорида – 0,30 г;
натрия цитрата – 0,58 г;
глюкозы – 2,55 г;
ромашки экстракт сухой – 0,25 г.

Форма выпуска: порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

Кристаллический порошок, от светло-желтого до коричневато-желтого цвета, с характерным запахом ромашки, сладко-соленого вкуса, легко растворим в воде.

Рекомендации по применению: Содержимое пакетика растворяют в 200 мл свежевыпouredенной и охлажденной до комнатной температуры воды. Принимать внутрь сразу после приготовления. При необходимости прием можно повторить. Приготовленный раствор хранить в холодильнике (2-8 °C) не более 24 часов.

В растворе, полученном при растворении 1 пакетика в 200 мл воды, содержатся следующие концентрации действующих веществ:

Натрия хлорид	44,5 ммоль/л
Калия хлорид	20,1 ммоль/л
Натрия цитрат	9,9 ммоль/л
Глюкоза	70,8 ммоль/л
Na+	18,3 ммоль/л
K+	10,6 ммоль/л
Cl-	36,6 ммоль/л
Цитрат	9,1 ммоль/л

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Меры предосторожности: следует проявлять осторожность, применяя раствор Регидол при сахарном диабете, нарушении функции почек или печени, при соблюдении диеты с ограниченным потреблением калия. В одном пакетике содержится 2,55 г глюкозы. На это следует обратить внимание при применении препарата у пациентов с сахарным диабетом.

Условия хранения: хранить при температуре ниже 25 °C, в сухом, защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте!

При хранении допускается образование конгломератов, растворимых в воде.

Изготовитель: ООО ДЕПОФАРМ, ул. Тигина, 30/2, MD 6501
г. Анений Ноу, Республика Молдова.

Упаковано: ЗАО «Интеграфарм», 223045, Минская область,
Минский район, Юзуфовский с/с, 8-5, район аг. Юзуфово, Беларусь.

Организация, принимающая претензии от потребителей:
ЗАО «Интеграфарм», Беларусь.

Свидетельство о государственной регистрации
№ АМ.01.11.01.003.R.000270.08.23 от 07.08.2023.

Места реализации определяются национальным законодательством
государств-членов Евразийского экономического союза.

