

**ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ,
ПОСКОЛЬКУ В НЕМ СОДЕРЖАТСЯ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС СВЕДЕНИЯ**

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет *Фитолэнд сироп исландского мха*, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом *Фитолэнд сироп исландского мха*.
3. Прием *Фитолэнд сироп исландского мха*.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение *Фитолэнд сироп исландского мха*.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 09.11.2021 № 1411

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИТОЛЭНД СИРОП ИСЛАНДСКОГО МХА, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

1 мл *Фитолэнд сироп исландского мха* содержит 1,15 мг экстракта мха исландского сухого (3:1) (экстрагент – вода).

Фитолэнд сироп исландского мха – лекарственный препарат на основе компонентов растительного происхождения. Полисахариды в составе экстракта оказывают обволакивающее действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, способствуя уменьшению кашлевого рефлекса и облегчению сухого, раздражающего кашля.

Фитолэнд сироп исландского мха применяется в составе комплексной терапии при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, раздражении слизистой оболочки полости рта и глотки, сопровождающихся сухим кашлем.

Применение по указанным показаниям основывается только на опыте продолжительного применения.

Фитолэнд сироп исландского мха показан к применению у взрослых и детей старше 12 лет.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ФИТОЛЭНД СИРОП ИСЛАНДСКОГО МХА

Не применяйте *Фитолэнд сироп исландского мха* при повышенной чувствительности к действующему веществу или к вспомогательным веществам, указанным в разделе 6.

Особые предупреждения и меры предосторожности

При нарушениях функции дыхательных путей, сопровождающихся затруднением дыхания, повышением температуры, выделением кровянистой или гнойной мокроты, необходимо немедленно обратиться к врачу. Пациентам с хроническим кашлем перед приемом лекарственного препарата необходимо обратиться к врачу.

Если состояние не улучшается через 7 дней лечения, следует обратиться к врачу.

Дети

Применение у детей до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 144/Б

Другие лекарственные препараты и *Фитолэнд сироп исландского мха*

Возможно замедление всасывания других лекарственных средств при одновременном приеме. В качестве меры предосторожности *Фитолэнд сироп исландского мха* следует принимать за 0,5 часа – 1 час до или после приема других лекарственных препаратов.

Беременность и кормление грудью

Не рекомендуется принимать во время беременности и в период лактации в связи с ограниченными данными по применению.

Нет данных о влиянии препарата на fertильность у человека.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Нет информации о влиянии препарата на способность управления транспортными средствами и работе с механизмами.

Фитолэнд сироп исландского мха содержит сорбитол

Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. ПРИЕМ ФИТОЛЭНД СИРОП ИСЛАНДСКОГО МХА

Как применять *Фитолэнд сироп исландского мха*

Дети от 12 до 16 лет: 10 мл сиропа четыре раза в сутки.

Взрослые и подростки старше 16 лет: 15 мл сиропа четыре раза в сутки.

Фитолэнд сироп исландского мха не рекомендуется детям в возрасте до 12 лет.

Продолжительность лечения зависит от причины и степени тяжести заболевания и может составлять 7 - 14 дней. Если во время приема препарата в течение 7 дней симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, следует проконсультироваться с врачом.

Способ применения

Не рекомендуется принимать пищу или пить жидкость сразу после приема сиропа, так как в таком случае препарат может быть слишком быстро удален со слизистой оболочки полости рта и глотки. При применении *Фитолэнд сироп исландского мха* рекомендовано обильное питье (чай или другие теплые напитки), однако, не непосредственно после приема препарата.

Перед употреблением флакон с сиропом следует встряхнуть.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Как и все лекарственные препараты, *Фитолэнд сироп исландского мха* может иметь побочные реакции, но они проявляются не у каждого пациента. Если Вы наблюдаете у себя следующие побочные реакции, проинформируйте Вашего врача, чтобы он определил дальнейшие действия.

При оценке побочных действий за основу берутся следующие данные относительно частоты возникновения:

СОГЛАСОВАНО

Очень часто:	Более 1 пациента из 10	МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Часто:	1 - 10 пациентов из 100	Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Нечасто:	1 - 10 пациентов из 1 000	
Редко:	1 - 10 пациентов из 10 000	
Очень редко:	Менее 1 пациента из 10 000	
Неизвестно:	Невозможно оценить частоту возникновения на основе имеющихся данных.	

НД РБ**Возможные побочные реакции****2974Б - 2021**Нарушения со стороны иммунной системы

Частота неизвестна: реакции гиперчувствительности.

Имеются сообщения об единичных случаях развития зуда, тошноты, болей в животе, опущения жжения слизистой оболочки полости рта.

Если наблюдаются тяжелые побочные реакции, то лечение препаратом должно быть прекращено.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по применению препарата. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях и неэффективности лекарственных препаратов:

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: с использованием формы извещения о нежелательной реакции на сайте www.rceth.by, по электронной почте rcpl@rceth.by или по адресу: Товарищеский пер. 2а, г. Минск, 220037, Республика Беларусь, тел/факс 242-00-29.

5. ХРАНЕНИЕ ФИТОЛЭНД СИРОП ИСЛАНДСКОГО МХА

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не применяйте данный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ***Фитолэнд сироп исландского мха содержит***

1 мл *Фитолэнд сироп исландского мха* содержит 1,15 мг экстракта мха исландского сухого (3:1) (экстрагент – вода).

Вспомогательными веществами являются: сорбитола раствор некристаллизующийся (E420), ксантановая камедь, натрия бензоат (E211), лимонная кислота моногидрат (E330), лимонное масло, вода очищенная.

Внешний вид лекарственного препарата и содержимое упаковки

Форма выпуска и описание. Сироп. Вязкая жидкость от желто-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом. Допускается образование осадка и/или помутнение.

Упаковка. По 100 мл во флаконах из полиэтилентерефталата коричневого цвета. Флаконы укупоривают колпачками полимерными винтовыми коричневого цвета с предохранительным

кольцом и уплотнительной прокладкой.

Флакон вместе с прозрачным мерным стаканчиком из полипропиленовой тары в комплекте с вкладышем помещают во вторичную упаковку из картона коробочного.

Порядок отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью
«ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»), Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124,
к. 3, тел/факс (+375 17) 373-31-90, тел. 8 (01770) 63939.

БОЛДАСОРДО
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СТАКНОМ-ВКЛАДЫШЕМ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
РД РБ

29746 - 2021