

Листок-вкладыш - информация для пациента

Клотримазол, 1 %, раствор для наружного применения

Действующее вещество: клотримазол.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно Вам потребуются прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол.
3. Применение препарата Клотримазол.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Клотримазол.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.
4. Что из себя представляет препарат Клотримазол и для чего его применяют

Препарат Клотримазол содержит действующее вещество клотримазол, относится к группе противогрибковых средств. Противогрибковый эффект препарата Клотримазол связан с нарушением образования клеточной мембраны грибов, что вызывает последующее разрушение клеток.

Показания к применению

Клотримазол показан к применению у взрослых и детей при грибковых заболеваниях кожи, вызванных дерматофитами, дрожжевыми (включая род *Candida*), плесневыми и другими грибами и возбудителями, чувствительными к клотримазолу.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол

Противопоказания

- если у Вас аллергия на клотримазол или другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Клотримазол следует применять только наружно.

Не наносите препарат на кожу в области глаз.

При появлении аллергических реакций или раздражения в месте нанесения препарата, прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Для предотвращения повторного инфицирования следует соблюдать правила гигиены.

Если клинические признаки инфекции сохраняются после завершения лечения, следует обратиться к врачу. Сообщите лечащему врачу, если у Вас имеются нарушения функции печени. Ваш врач периодически будет контролировать функциональное состояние печени.

Другие препараты и препарат Клотримазол
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты. Амфотерицин В, натамицин снижают эффективность клотримазола при одновременном применении.

Беременность и грудное вскармливание
Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Клотримазол содержит пропилентгликоль
Препарат содержит пропилентгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

3. Применение препарата Клотримазол

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Раствор наносят тонким слоем 2-3 раза в день на пораженные участки кожи и аккуратно втирают. Несколько капель достаточно, чтобы обработать область применения размером с ладонь руки.

Путь и способ введения

Наружно. Пораженные участки кожи предварительно необходимо очистить с применением мыла с нейтральным значением pH и осушить.

Продолжительность терапии

Лечение следует продолжать до устранения проявления заболевания. Для предотвращения возвращения болезни, лечение рекомендуется продолжать еще в течение 2 недель после устранения проявления заболевания. Препарат Клотримазол предназначен только для наружного применения.

Если Вы случайно проглотили раствор или раствор случайно попал в глаза или рот, немедленно промойте глаза или рот водой и обратитесь к врачу.

Если Вы забыли использовать препарат Клотримазол
Используйте раствор как можно скорее, а затем продол-

жайте лечение в обычном режиме.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Вы можете ускорить выздоровление, если будете следовать этим простым советам:

- Постарайтесь не расчесывать зараженную область, т.к. расчесывание повредит поверхность кожи и вызовет дальнейшее распространение инфекции.
- Следите за чистой пораженных участках кожи.
- Уделите особое внимание сушке кожи, но избегайте чрезмерного трения.
- Не делитесь полотенцами, ковриками для ванной с другими людьми, так как Вы можете передать им инфекцию.
- Всегда мойте руки после обработки зараженных участков кожи, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарственного средства, обратитесь к врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Серьезные нежелательные реакции

Если Вы заметили любую из перечисленных ниже серьезных нежелательных реакций – прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу, Вам может потребоваться медицинская помощь.

Нарушения со стороны иммунной системы

Аллергическая реакция (проявляющаяся появлением кожных пузырей, одышкой, снижением артериального давления, обмороком).

Другие побочные эффекты:

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Сыпь,
зуд,
волдыри,
шелушение,
боль/дискомфорт,
отеки,
жжение,
раздражение,
покраснение,
покалывание.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникнут какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация также относится к любым нежелательным реакциям, не указанным в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 800 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Веб-сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Клотримазол

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на флаконе и картонной упаковке (пачке) после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С в картонной упаковке (пачке).

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки, прочие сведения

Раствор для наружного применения.

Препарат Клотримазол содержит:

Действующим веществом препарата Клотримазол является клотримазол.

1 мл раствора содержит 10 мг клотримазола.

Вспомогательным веществом является:

Пропиленгликоль.

Внешний вид препарата Клотримазол и содержимое упаковки

Раствор для наружного применения

Прозрачный, бесцветный или почти бесцветный, с желтоватым или коричневатым оттенком вязкий раствор со слабым характерным запахом.

По 15, 20, 25 мл препарата во флакон из коричневого стекла или флакон из смеси полистилена высокой и низкой плотности, снабженные пробкой-капельницей пластиковой, укуренные крышкой винтовой из смеси полистилена высокой и низкой плотности с контролем первого вскрытия.

На флакон наклеивают этикетку самоклеющуюся.

Один флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению (листок-вкладыш) помещают в картонную упаковку (пачку).

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Держатель регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «РИФ»

445351, Самарская обл., г.о Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6, помещ. 272.

Производитель:

Российская Федерация

ООО «Озон»

Самарская обл., г.о Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «Озон»

445351, Самарская обл., г.о Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Тел.: +79874599991, +79874599992

E-mail: ozon@ozon-pharm.ru

Листок-вкладыш перемотрен: —