

9712 - 2022

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного препарата

Мексидол® ФОРТЕ 250

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «29» 06.2022 № 866

Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочитайте всю информацию листка-вкладыша

— Сохраните данный листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочитать его ещё раз.

— Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

— Этот лекарственный препарат прописан только Вам. Не следует передавать его другим лицам, поскольку он может им навредить, даже если симптомы их заболевания схожи с Вашими

Название лекарственного препарата: Мексидол® ФОРТЕ 250, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Химическое название: 2-этил-6-метил-3-гидроксиридиана сукцинат.

Форма выпуска: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Описание: Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-розового цвета.

Состав на 1 таблетку:

Действующее вещество:

Этилметилгидроксиридиана сукцинат – 250,0 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, повидон K-30, магния стеарат.

Пленочная оболочка: Опадрай II розовый 33G240018 (гипромеллоза, титана диоксид, лактозы моногидрат, макрогол 4000, триацетин, краситель железа оксид красный (E172 (ii)), краситель железа оксид желтый (E172 (iii))).

Фармакотерапевтическая группа: Прочие лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний нервной системы.

Код ATC: N07XX

Фармакологические свойства

Мексидол® ФОРТЕ 250 является ингибитором свободнорадикальных процессов, мембранопротектором, обладающим антигипоксическим, стресс-протективным, ноотропным, противосудорожным и анксиолитическим действием. Лекарственный препарат повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов (шок, гипоксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и анти психотическими средствами (нейролептиками)).

Механизм действия Мексидола обусловлен его антиоксидантным, антигипоксантным и мембранопротекторным действием. Он ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение липид-белок, уменьшает вязкость мембранны, увеличивает ее текучесть. Мексидол® ФОРТЕ 250 модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальций-независимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что усиливает их способность связывания с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспорта нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. Мексидол® ФОРТЕ 250 повышает содержание в головном мозге дофамина. Вызывает усиление компенсаторной активации

9712 - 2022

аэробного гликолиза и снижение степени угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии с увеличением содержания АТФ и креатинфосфата, активацию энергосинтезирующих функций митохондрий, стабилизацию клеточных мембран.


Лекарственный препарат улучшает метаболизм и кровоснабжение головного мозга, улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов) при гемолизе. Обладает гиполипидемическим действием, уменьшает содержание общего холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Антистрессорное действие проявляется в нормализации постстрессового поведения, соматовегетативных нарушений, восстановлении циклов сон-бодрствование, нарушенных процессов обучения и памяти, снижении дистрофических и морфологических изменений в различных структурах головного мозга.

Показания к применению

В составе комплексной терапии пациентов со следующей патологией:

- последствия острых нарушений мозгового кровообращения, в том числе после транзиторной ишемической атаки, в фазе субкомпенсации в качестве профилактических курсов;
- энцефалопатии различного генеза (дисметаболическая, посттравматическая, смешанная);
- легкой черепно-мозговой травме, последствиях черепно-мозговой травмы;
- легких когнитивных расстройствах на фоне атеросклеротического поражения сосудов головного мозга.



Способ применения и дозы

Внутрь по 250 мг 3 раза в сутки.

Начальная доза – 250 мг (1 таблетка) 1-2 раза в сутки с постепенным повышением до терапевтического эффекта. Максимальная суточная доза – 750 мг (3 таблетки).

Длительность лечения – 2-6 недель.

Повторные курсы (по рекомендации врача), желательно проводить в весенне–осенние периоды.

Если Вы пропустили прием одной дозы препарата, примите следующую дозу согласно Вашему обычному графику в надлежащее время. Не принимайте двойную дозу препарата для восполнения пропущенной дозы.

Если у Вас возникли вопросы по применению препарата Мексидол® ФОРТЕ 250 или Вы хотите прекратить лечение, обратитесь к своему лечащему врачу.

Побочное действие

Частота побочных эффектов определялась в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто ($\geq 10\%$); часто ($\geq 1\%$, но $<10\%$); нечасто ($\geq 0,1\%$, но $<1\%$); редко ($\geq 0,01\%$, но $<0,1\%$); очень редко ($<0,01\%$); частота неизвестна (частота не может быть определена на основе имеющихся данных).

Нарушения со стороны иммунной системы: очень редко – ангионевротический отек, крапивница.

Психические нарушения: очень редко – сонливость.

Нарушения со стороны нервной системы: очень редко – головная боль.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень редко – сухость во рту, тошнота, боль, жжение и дискомфорт в эпигастральной области, изжога, метеоризм, диарея.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: очень редко – сыпь, зуд, гиперемия.

Противопоказания

- Индивидуальная повышенная чувствительность к лекарственному препарату.
- Острая почечная и/или почечная недостаточность.
- Дети и подростки до 18 лет, (в связи с недостаточной изученностью действия препарата).
- Беременность и период лактации, (в связи с недостаточной изученностью действия препарата).
- Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Передозировка

Симптомы: сонливость, бессонница.

Лечение: в связи с низкой токсичностью передозировка маловероятна. Лечение, как правило, не требуется, симптомы исчезают самостоятельно в течение суток. При выраженных проявлениях проводится поддерживающее и симптоматическое лечение.

Меры предосторожности

Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, непереносимостью галактозы, галактоземией или глюкозо-галактозной мальабсорбией не следует принимать этот препарат.

Применение в период беременности и в период лактации

Применение препарата Мексидол® ФОРТЕ 250 в период беременности и в период лактации противопоказано, т.к. строго контролируемых клинических исследований безопасности применения лекарственного препарата при беременности и кормлении грудью не проводилось.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

В период приема препарата Мексидол® ФОРТЕ 250 следует соблюдать осторожность при работе, требующей быстроты психофизических реакций (управление транспортными средствами, механизмами и т.п.).


Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Мексидол® ФОРТЕ 250 сочетается со всеми препаратами, используемыми для лечения соматических заболеваний. Усиливает действиеベンзодиазепиновых препаратов, антидепрессантов, анксиолитиков, противоэпилептических средств (карбамазепина) и противопаркинсонических средств (леводопа), нитратов. Уменьшает токсическое действие этанола.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 4 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачку картонную.

Условия отпуска

По рецепту.

Информация о производителе

ЗАО «ЗиО-Здоровье», Россия, 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2

Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии:
ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», Россия, 115407, г. Москва, ул. Судостроительная, д. 41, этаж 1, пом. 12

Тел./факс: +7 (495) 626-47-55