

Будесонид
Под давлением
Ингаляция ВР

Budesone™ 100/200/400
Ингаляция

СОСТАВ
Budesone 100
Ингаляция

Каждое нажатие доставляет:
Будесонид ВР... 100 мкг
Взвешенный в инертном
растворителе
и
Аэрозольный пропеллент ...
достаточное количество (q.s.)
Добавлены соответствующие
излишки

Вспомогательные вещества:
Этанол ВР ... 1,0% м/м
Сорбитан триолеат ВР
Пропеллент НФА 134а (1,1,1,2
Тетрафторэтан)

Budesone 200
Ингаляция

Каждое нажатие доставляет:
Будесонид ВР ... 200 мкг
Взвешенный в инертном
растворителе
и
Аэрозольный пропеллент ...
достаточное количество (q.s.)
Добавлены соответствующие
излишки

Вспомогательные вещества:
Этанол ВР... 1,0% м/м
Сорбитан триолеат ВР
Пропеллент НФА 134а
(1,1,1,2 Тетрафторэтан)

Budesone 400
Ингаляция

Каждое нажатие доставляет:
Будесонид ВР ... 400 мкг
Суспендированный в инертном
растворителе
и
Аэрозольный пропеллент ...
достаточное количество (q.s.)
Добавлены соответствующие
излишки

Вспомогательные вещества:
Этанол ВР ... 1,0% м/м
Сорбитан триолеат ВР
Пропеллент НФА 134а
(1,1,1,2 Тетрафторэтан)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Ингаляционный аэрозоль.

ОПИСАНИЕ
Будесонид —
противовоспалительный
синтетический кортикостероид.
Будесонид
выпускается в виде смеси двух
эпимеров (22R и 22S).

ПОКАЗАНИЯ

Лечение легкой, умеренной и
тяжелой персистирующей астмы.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Взрослые и дети старше 12 лет:
1-2 ингаляции каждые
четыре-шесть часов.
200 мкг два раза в день, утром и
вечером.

В периоды тяжелой астмы
суточную дозу можно увеличить
до 1600 мкг.
У пациентов, у которых астма
хорошо контролируется,
суточная доза может быть
снижена до менее 400 мкг, но не
должна опускаться ниже 200 мкг.
Пациентам следует
поддерживать самую низкую
дозу, которая будет эффективно
контролировать симптомы.

Дети младше 2 лет:

1 ингаляция три-четыре раза в
день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная
чувствительность к любому из
компонентов препарата.

ВНИМАНИЕ

Применять только по
назначению врача. Если
рекомендуемая доза не
обеспечивает
облегчения симптомов или
симптомы ухудшаются,
обратитесь к врачу.

СРОК ГОДНОСТИ

См. на упаковке.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в защищенном от
света и влаги месте при
температуре не выше 30 °С.
Не замораживать.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Ингаляторы Budesone
100/200/400 выпускаются в
баллончиках, содержащих 200
дозированных доз.

Только для
использования
зарегистрированным
врачом, больницей или
лабораторией.

Листок-вкладыш для пациента

Перед использованием
ингалятора внимательно
прочтите этот листок и
следуйте инструкциям.


MIDASCARE



MIDASCARE /логотип/
Производитель:
MidasCare
Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
B-16, MIDC, Waluj,
Чхатрапати амбхаджинагар,
- 431 136, Индия.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНГАЛЯТОР


Проверка ингалятора




Перед первым
использованием ингалятора
или если он не
использовался в течение
недели или более,
«проверьте его», т. е.
сделайте один выпуск в
воздух.

Использование ингалятора

1. Снимите крышку мундштука
и проверьте, что мундштук
чистый.
Хорошо встряхните ингалятор.
Держите ингалятор
вертикально, как показано,
положив большой палец на
основание.
Положите один или два пальца
на верхнюю часть баллона.



2. Мягко выдохните через рот.




3. Поместите мундштук
ингалятора в рот между зубами
и обхватите его губами (не
кусайте). Начните медленно
вдыхать через рот. Вдыхая,
нажмите на баллончик, чтобы
выпустить одну дозу,
продолжая при этом ровно и
глубоко вдыхать.



4. Выньте ингалятор изо рта и
задержите дыхание на 10
секунд или на столько,
сколько вам будет удобно.
Медленно выдохните.



5. Если требуется еще одна
доза, подождите не менее
одной минуты. Повторите
шаги 2-4. После
использования наденьте
колпачок на мундштук.



Не торопитесь с шагами 3 и 4.
Важно, чтобы вы начали
вдыхать как можно медленнее,
непосредственно перед тем,
как выпустить дозу.
Попрактикуйтесь перед
зеркалом первые несколько
раз.
Если вы видите,
"туман",
выходящий из
верхней части
ингалятора или
из уголков рта,
начните снова
с шага 1. Этот
выходящий туман указывает
на неправильную технику.


6. После завершения ингаляции
прополощите рот водой. Не
глотайте

Очистка

Необходимо содержать
пластиковый мундштук в
чистоте, чтобы обеспечить
надлежащую работу
ингалятора.

Очищайте ингалятор не реже
одного раза в неделю
следующим образом:

1. Аккуратно вытащите
металлический баллон из
пластикового корпуса
ингалятора.
Снимите крышку мундштука.
2. Погрузите пластиковый
корпус и крышку мундштука
в теплую воду. Не кладите
металлический баллон в
воду.
3. Затем промойте
пластиковый корпус и
крышку мундштука под
проточной водой.



4. Тщательно встряхните,
чтобы удалить излишки
воды. Оставьте сохнуть.
Избегайте использования
тепла для сушки деталей.
5. Когда пластиковый корпус
высохнет, правильно
установите баллон и крышку
мундштука.

Предупреждение

1. Если рекомендуемая доза
не обеспечивает желаемого
эффекта, обратитесь к врачу.
Превышать рекомендуемую
дозу опасно.
2. Металлический баллон
находится под давлением. Не
прокалывайте и не сжигайте
его,
даже если он, по-видимому,
пустой.
3. Не допускайте попадания в
глаза.
4. Хранить в недоступном для
детей месте.