

Листок-вкладыш — информация для пациента Меновазин раствор для наружного применения спиртовой

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Меновазин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Меновазин.

3. Применение препарата Меновазин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Меновазин.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Меновазин, и для чего его применяют.

Препарат Меновазин, раствор для наружного применения спиртовой:

Содержит в 100 мл препарата:

Действующие вещества:

Левоментол (L-ментол) - 2,5 г

Проканна гидрохлорид (Новокаина гидрохлорид) - 1,0 г

Бензокаин (Анестезин) - 1,0 г

Вспомогательное вещество:

Спирт этиловый (этанол) 70 % - до 100 мл.

Фармакотерапевтическая группа: анестетики; местные анестетики; эфиры аминокислоты.

Показания к применению

Препарат Меновазин показан к применению у взрослых старше 18 лет. В качестве местноанестезирующего средства при невралгиях, миалгиях, артралгиях.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Меновазин

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема), беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Меновазин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не наносить препарат на воспаленную кожу или при нарушении целостности кожных покровов. Не наносить препарат на слизистые оболочки. Избегать попадания препарата в глаза. При случайном попадании препарата в глаза следует обильно промыть их водой.

После использования препарата рекомендуется вымыть руки.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности (безопасность и эффективность применения препарата Меновазин у детей в возрасте до 18 лет не установлены).

Другие препараты и препарат Меновазин

Не изучалось. Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применение других препаратов.

Беременность и грудное вскармливание

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстрой психомоторных реакций.

3. Применение препарата Меновазин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Режим дозирования и способ применения

Наружно. Наносят на кожу над пораженной областью и растирают 2-3 раза в сутки. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс лечения повторяют.

Если Вы применили препарат Меновазин больше, чем следовало

Если Вы получили слишком большую дозу препарата Меновазин, у Вас могут возникнуть следующие симптомы:

- аллергические реакции,

- контактный дерматит,

- головокружение,

- общая слабость,

- снижение артериального давления,

- любые другие побочные реакции, перечисленные в разделе «Возможные нежелательные реакции».

Если Вы считаете, что получили слишком большую дозу препарата Меновазин следует прекратить применение препарата, промыть поврежденное место водой и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

При случайном приеме лекарственного препарата внутрь необходим промыть желудок и немедленно обратиться к врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Меновазин может вызывать

нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно прекратите применение препарата Меновазин и обратитесь к врачу, если у Вас наблюдаются следующие нежелательные реакции:

Аллергические реакции, контактный дерматит. При продолжительном применении возможно головокружение, общая слабость, снижение артериального давления.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефоны: +7 8005509903

Факс: +7 (495) 698-15-73

Электронная почта: phamti@roszdravnadzor.gov.ru

www.roszdravnadzor.gov.ru

Кыргызская Республика

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве

здравоохранения Кыргызской Республики

Телефоны: +996 312 21-92-78, 0800 300 26 26

Факс: +996 312 21-05-08

Электронная почта: dlisti@pham.kg

www.pham.kg

5. Хранение препарата Меновазин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется.

Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Меновазин, раствор для наружного применения спиртовой содержит во флаконе по 40 мл или 100 мл:

Действующие вещества:

Левоментол (L - ментол) - 2,5 г

Прокаина гидрохлорид (Новокаина гидрохлорид) - 1,0 г

Бензокаин (Анестезин) - 1,0 г

Вспомогательное вещество:

Спирт этиловый (этанол) 70 % - до 100 мл

Внешний вид препарата Меновазин и содержимое упаковки

Бесцветная прозрачная жидкость с запахом ментола.

По 40 мл или 100 мл во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ, укуренных крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкой плотности или высокой плотности с уплотнительным элементом или укуренных пробками из полипропилена, или полиэтилена высокой плотности и крышками навинчиваемыми из полипропилена, или полиэтилена высокой плотности;

или по 40 мл или 100 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укуренных колпачками винтовыми с расплывителем или укуренных крышками навинчиваемыми из полипропилена, или полиэтилена высокой плотности с уплотнительным элементом с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, или укуренных пробками из полипропилена, или полиэтилена высокой плотности и крышками навинчиваемыми из полипропилена, или полиэтилена высокой плотности без контроля первого вскрытия или с контролем первого вскрытия; Каждый флакон/флакон-капельницу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Флаконы или флаконы-капельницы без пачек для стационаров с равным количеством листов-вкладышей помещают в групповую упаковку.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»

150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5;

т/ф (4852) 44-38-56.

Производитель

Российская Федерация

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»

150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5;

т/ф (4852) 44-38-56.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»

Адрес: 150030, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5

Телефон/факс: +7 (4852) 44-38-58

Электронная почта: famfab@yarosavlavl.ru

Кыргызская Республика

ООО «DasMed»

Адрес: 720043, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Садыгалиева, 1

Телефон/факс: +996 312 35-75-42

Электронная почта: pv@dasmed.kg

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на вебсайте

Союза: <https://eec.eaeunion.org>