

Листок-вкладыш – информация для пациента

Дексонал®, 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: декскетопрофен

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Дексонал®, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Дексонал®
3. Прием препарата Дексонал®
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Дексонал®
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Дексонал®, и для чего его применяют

Препарат Дексонал® содержит действующее вещество декскетопрофен и относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Декскетопрофен оказывает обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.

Показания к применению

Препарат Дексонал® показан к применению у взрослых при скелетно-мышечной боли (слабо или умеренно выраженной), альгодисменорее, зубной боли.

Препарат предназначен для симптоматического лечения, уменьшения боли и воспаления на момент применения. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к лечащему врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Дексонал®

Противопоказания

Не принимайте препарат Дексонал®:

- если у Вас аллергия на декскетопрофен или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные противовоспалительные препараты;
- если Вам был поставлен один из перечисленных диагнозов или несколько диагнозов: бронхиальная астма (или были приступы бронхиальной астмы в прошлом), острый аллергический ринит (кратковременное воспаление слизистой оболочки носа), полипы в полости носа (образования в полости носа, появление которых связано с аллергией), крапивница (кожная сыпь), ангионевротический отек (отек лица, глаз, губ или языка, затруднение дыхания) или свистящие хрипы в груди после приема ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов;
- если у Вас были фотоллергические или фототоксические реакции (особая форма покраснения и/или образования пузырей на коже под воздействием солнечного света) при приеме кетопрофена (нестероидного противовоспалительного препарата) или фибратов (препаратов, применяемых для снижения уровня жиров в крови);
- если у Вас язвенная болезнь желудка/двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечное

- у Вас имеются нарушения кровотечения и образования клеток крови;
- у Вас имеется системная красная волчанка или смешанное заболевание соединительной ткани (нарушения со стороны иммунной системы, которые влияют на соединительную ткань);
- у Вас ранее диагностировано хроническое воспалительное заболевание кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);
- у Вас имеются или были в прошлом другие нарушения со стороны желудка или кишечника;
- у Вас есть инфекция (см. подраздел «Инфекции» ниже);
- Вы принимаете другие лекарственные препараты, которые увеличивают риск развития язвенной болезни или кровотечения (например, глюкокортикостероиды для приема внутрь), некоторые антидепрессанты (такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, в том числе циталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралин), препараты, предотвращающие образование тромбов (антиагреганты, например ацетилсалициловая кислота) или антикоагулянты (например, варфарин). В таких случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем применять препарат Дексонал®; врач может назначить Вам дополнительный препарат для защиты желудка (например, мизопростол или препараты, которые блокируют выработку соляной кислоты в желудке);
- у Вас имеется бронхиальная астма в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или полипозом полости носа, поскольку Вы, по сравнению с другими людьми, подвержены повышенному риску развития аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или нестероидные противовоспалительные препараты. При применении данного лекарственного препарата возможно развитие приступов бронхиальной астмы или бронхоспазма, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или нестероидные противовоспалительные препараты;
- если у Вас были или имеются туберкулез (инфекционное заболевание, при котором поражаются чаще легкие, но могут поражаться и другие органы), остеопороз (заболевание, при котором поражаются кости рук, ног, позвоночника), любые другие тяжелые заболевания различных органов или если Вы злоупотребляете алкоголем.

Инфекции

Препарат Дексонал® может скрывать такие признаки инфекций, как лихорадка и боль. Поэтому вполне возможно, что прием этого препарата может отсрочить соответствующее лечение инфекции, что, в свою очередь, может привести к повышенному риску осложнений. Это наблюдалось при пневмонии, вызванной бактериями, и при бактериальных инфекциях кожи, связанных с ветряной оспой. Если Вы принимаете этот препарат при инфекции, а симптомы инфекции сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь к врачу.

Дети и подростки

Не давайте препарат Дексонал® детям и подросткам в возрасте до 18 лет.

Другие препараты и препарат Дексонал®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Нежелательные комбинации

- Ацетилсалициловая кислота, кортикостероиды или другие нестероидные противовоспалительные препараты.
- Варфарин, гепарин или другие лекарственные препараты, применяемые для профилактики образования тромбов.
- Литий, применяемый для лечения определенных эмоциональных расстройств.
- Метотрексат (противоопухолевый препарат или

- кровотечение, или если в прошлом у Вас было желудочно-кишечное кровотечение, изъязвление или перфорация;
- если у Вас хроническое нарушение пищеварения (например, расстройство желудка, изжога);
- если у Вас в настоящее время или в прошлом было кровотечение или перфорация желудка или кишечника в связи с предшествующим применением нестероидных противовоспалительных препаратов для лечения боли;
- если у Вас имеется заболевание кишечника с хроническим воспалением (болезнь Крона или язвенный колит);
- если у Вас серьезная сердечная недостаточность;
- если Вам была проведена операция на сердце (аортокоронарное шунтирование);
- если у Вас умеренные или серьезные нарушения со стороны почек, прогрессирующее заболевание почек или у Вас повышенное содержание калия в крови (гиперкалиемия);
- если Вы страдаете тяжелым заболеванием печени;
- если у Вас есть склонность к кровотечению (нарушение гемостаза) или нарушение свертываемости крови;
- если Вы сильно обезвожены (потеряли много жидкости) вследствие рвоты, диареи или потребления жидкости в недостаточном количестве;
- если Вы беременны (срок 20 недель и более) или Вы кормите ребенка грудью;
- если Вы моложе 18 лет.

Если любое из перечисленных утверждений относится к Вам (или у Вас есть сомнения), обязательно сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Дексонал® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Не превышайте доз, указанных в листовке-вкладыше.
На фоне применения нестероидных противовоспалительных препаратов у некоторых пациентов отмечалось развитие тяжелых кожных реакций. При появлении кожной сыпи, поражении слизистых оболочек или других проявлений гиперчувствительности прекратите прием препарата Дексонал® и обратитесь к врачу.

Обязательно предупредите Вашего лечащего врача, если какое-либо из нижеуказанных пунктов относится к Вам:

- у Вас есть аллергия или у Вас были аллергические реакции в прошлом;
- у Вас имеются заболевания почек, печени или сердца (артериальная гипертензия и/или сердечная недостаточность), а также задержка жидкости или имелося какое-либо из этих заболеваний в прошлом;
- Вы беременны (срок до 20 недель);
- у Вас было диагностировано нарушение порфиринового обмена (порфирия);
- Вы принимаете диуретики или у Вас недостаточный объем жидкости в организме и уменьшение объема крови из-за чрезмерной потери жидкости (например, из-за частого мочеиспускания, диареи или рвоты), или Вы недавно перенесли хирургическое вмешательство;
- у Вас имеются заболевания сердца, перенесенный инсульт или возможный риск возникновения этих заболеваний (например, если у Вас высокое артериальное давление, сахарный диабет или высокий уровень холестерина, или Вы курите), в этом случае Вам следует обсудить свое лечение со своим врачом или работником аптеки. Прием лекарственных препаратов, таких как Дексонал®, может быть связан с небольшим повышением риска сердечного приступа (инфаркт миокарда) или инсульта. Любой риск повышается при применении высоких доз препарата или при его длительном применении. Не следует превышать рекомендованную дозу или продолжительность лечения;
- если Вы являетесь лицом пожилого возраста, то Вы более подвержены развитию побочных реакций (см. раздел 4 листовки-вкладыша). В случае развития данных реакций немедленно обратитесь к врачу;
- Вы являетесь женщиной с нарушением репродуктивной функции (препарат Дексонал® может повлиять на эту функцию, поэтому Вам не следует его применять, если Вы планируете забеременеть или если Вам проводят обследование репродуктивной функции);

иммунодепрессант), применяемый в высоких дозах (15 мг в неделю или выше).

- Гидантоины, применяемые при эпилепсии.
- Сульфаниламиды, применяемые при бактериальных инфекциях.

Комбинации, требующие соблюдения мер предосторожности

- Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), диуретики и антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II), применяемые при повышенном артериальном давлении и заболеваниях сердца.
- Пентоксифиллин, применяемый для лечения хронических венозных язв.
- Зидовудин, применяемый для лечения вирусных инфекций.
- Аминогликозидные антибиотики, применяемые для лечения бактериальных инфекций.
- Производные сульфонилмочевины (например, хлорпропамид и глибенкламид), применяемые при сахарном диабете.
- Метотрексат, применяемый в низких дозах (менее 15 мг в неделю).

Одновременное применение, требующее внимания

- Хинолоновые антибиотики (например, ципрофлоксацин, левофлоксацин), применяемые для лечения бактериальных инфекций.
- Циклоспорин или такролимус, применяемые для лечения заболеваний иммунной системы и при трансплантации органов.
- Тромболитики (фибринолитики), то есть лекарственные препараты, применяемые для разрушения сгустков крови.
- Пробенецид, применяемый при подагре.
- Сердечные гликозиды, применяемые для лечения хронической сердечной недостаточности.
- Мифепристон, применяемый в качестве средства для прерывания беременности.
- Антидепрессанты типа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).
- Антиагреганты, применяемые для уменьшения агрегации тромбоцитов и образования тромбов.
- Бета-блокаторы, применяемые при повышенном артериальном давлении и нарушениях со стороны сердца.
- Тенофовир (противовирусное средство, применяемое при инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека).
- Деферазирокс, применяемый у пациентов с нарушением со стороны крови (талассемией).
- Пеметрексед (противоопухолевое средство).

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не принимайте препарат Дексонал®, начиная с 20-й недели беременности. Лечение на любом этапе беременности должно проводиться только по назначению врача.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Дексонал® в период грудного вскармливания.

Фертильность

Следует избегать приема препарата Дексонал® у женщин, которые планируют беременность. Прием препарата не рекомендуется во время обследования по поводу бесплодия.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Дексонал® может незначительно повлиять на Вашу способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами в результате возможного возникновения головокружения, нарушения зрения или сонливости. При появлении таких эффектов не садитесь за руль и не работайте с механизмами до исчезновения симптомов. Проконсультируйтесь с врачом.

3. Прием препарата Дексонал®

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем. При появлении сомнений посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Рекомендованная доза препарата Дексонал® обычно составляет ½ таблетки (12,5 мг) каждые 4–6 часов или 1 таблетка (25 мг) каждые 8 часов, но не более 3 таблеток в сутки (75 мг). Если через 3–5 дней Вы не почувствовали себя лучше или Ваше самочувствие ухудшилось, обратитесь к врачу. Врач скажет Вам, сколько таблеток в день Вы должны принимать и как долго следует принимать препарат. Необходимая доза препарата Дексонал® зависит от типа боли, степени ее выраженности и продолжительности.

Следует принимать минимальную эффективную дозу в течение самого короткого времени, необходимого для облегчения симптомов. Если у Вас есть инфекция и ее симптомы (например, лихорадка и боль) сохраняются или усиливаются, немедленно обратитесь к врачу (см. раздел 2).

Пациенты пожилого возраста, пациенты с заболеванием печени или почек

Если Вы пожилой человек или у Вас есть нарушения со стороны печени или почек, Вам следует начинать лечение с общей суточной дозы, составляющей не более 2 таблеток (50 мг) в сутки. Если препарат хорошо переносится, то у пациентов пожилого возраста доза препарата может быть позже увеличена до обычно рекомендуемой суточной дозы (75 мг). Если у Вас тяжелое заболевание почек или печени, то прием декскетопрофена Вам противопоказан.

Путь и (или) способ введения

Препарат Дексонал® предназначен для приема внутрь. Принимайте препарат во время еды, так как это помогает уменьшить риск побочных эффектов со стороны желудка или кишечника. Однако если Ваша боль сильная и Вам нужно более быстрое облегчение боли, Вы можете принять препарат натощак (как минимум за 30 минут до приема пищи), потому что в таком случае он лучше всасывается.

Если Вы приняли препарата Дексонал® больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком много таблеток этого лекарственного препарата, немедленно сообщите об этом Вашему врачу или работнику аптеки или обратитесь за неотложной медицинской помощью. Не забудьте взять с собой упаковку этого лекарственного препарата или этот листок-вкладыш.

Если Вы забыли принять препарат Дексонал®

Не следует принимать двойную дозу, чтобы восполнить пропущенный прием таблетки. Примите следующую обычную дозу в обычное время приема (см. подраздел «Рекомендованная доза» выше).

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Дексонал® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно прекратите прием препарата Дексонал® и обратитесь за медицинской помощью, если у Вас появится любая из следующих нежелательных реакций:

- нежелательные реакции со стороны желудка/кишечника в начале лечения (например, боль в животе, изжога или кровотечение), особенно если ранее у Вас наблюдались такие реакции в результате длительного применения противовоспалительных препаратов, и особенно если Вы относитесь к лицам пожилого возраста;
- если Вы заметите появление кожной сыпи, любые высыпания в полости рта и на половых органах или любые другие признаки аллергии, например, затрудненное дыхание или глотание, отек лица, губ, языка или горла.

вызывающим поражение соединительной ткани (системная красная волчанка или смешанное заболевание соединительной ткани), противовоспалительные препараты могут в редких случаях вызывать лихорадку, головную боль и напряжение (ригидность) мышц шеи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
«Горячая линия» Росздравнадзора: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Армения

0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5
АОЗТ «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна»
Телефон: +374 60 83-00-73, +374 10 23-08-96,
+374 10 23-16-82;
Телефон горячей линии отдела мониторинга безопасности лекарственных средств:
+374 10 200505, +374 96 220505
Электронная почта: vigilance@pharm.am
<http://pharm.am>

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а
УП «Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении»
Тел.: +375-17-299-55-14
Факс: +375-17-299-53-58
Телефон отдела фармаконадзора: + 375 17 242 00 29
Электронная почта: rceth@rceth.by
<http://www.rceth.by>

Республика Казахстан

010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, 13
(БЦ «Нурсаулет 2»)
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Тел.: +7 7172 78-99-11
Электронная почта: farm@dari.kz
www.ndda.kz

Кыргызская Республика

720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики
Тел.: +996 31221-92-78
Электронная почта: dlomt@pharm.kg
<http://pharm.kg>

5. Хранение препарата Дексонал®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат по истечении срока годности (срока хранения), указанного на упаковке, после слов «Годен до...».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию (водопровод).

Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Дексонал® содержит

Побочными веществами являются декскетопрофен

наблюдаться при приеме препарата Дексонал®

Часто

(могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- Тошнота и/или рвота.
- Боль в животе (преимущественно в верхней части живота).
- Диарея.
- Проблемы с пищеварением (диспепсия).

Нечасто

(могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- Ощущение вращения предметов (вертиго).
- Головокружение.
- Сонливость.
- Бессонница.
- Чувство тревоги.
- Головная боль.
- Ощущение сердцебиения.
- Покраснение кожи лица (приливы).
- Воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит).
- Запор.
- Сухость во рту.
- Метеоризм.
- Кожная сыпь.
- Утомляемость.
- Боль.
- Слабость (астения).
- Ощущение лихорадки и дрожи (озноб).
- Общее ухудшение самочувствия (общее недомогание).

Редко

(могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- Язвенная болезнь, прободение язвы или кровотечение при язвенной болезни, которое может проявляться как рвота кровью или стул черного цвета (мелена).
- Обморок.
- Высокое артериальное давление.
- Замедленное дыхание.
- Задержка воды и периферические отеки (например, в области щиколоток).
- Отек гортани.
- Потеря аппетита (анорексия).
- Патологическая чувствительность.
- Зудящая сыпь (крапивница).
- Воспалительное заболевание слюнных желез и волосяных фолликулов (акне).
- Повышенное потоотделение.
- Боль в спине.
- Частое мочеиспускание.
- Нарушения менструального цикла (у женщин).
- Проблемы с предстательной железой (у мужчин).
- Отклонение от нормальных показателей анализов функции печени (анализы крови).
- Повреждение клеток печени (гепатит).
- Острая почечная недостаточность.

Очень редко

(могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- Анафилактическая реакция (аллергическая реакция, которая также может привести к потере сознания).
- Одышка из-за сужения дыхательных путей (бронхоспазм).
- Ощущение нехватки воздуха (одышка).
- Учащенное сердцебиение.
- Низкое артериальное давление.
- Воспаление поджелудочной железы (панкреатит).
- Нечеткость зрения.
- Звон (шум) в ушах.
- Повышенная чувствительность кожи.
- Чувствительность к свету.
- Кожный зуд.
- Нарушения со стороны почек.
- Уменьшение количества лейкоцитов (нейтропения) и тромбоцитов в крови (тромбоцитопения).

Применение НПВП, к которым относится Дексонал®, может приводить к задержке жидкости и возникновению отеков (особенно в области голеностопных суставов и голеней), повышению артериального давления и развитию сердечной недостаточности.

Некоторые препараты, включая препарат Дексонал®, могут вызывать незначительное повышение риска сердечных приступов (инфаркта миокарда) или острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта). У пациентов с нарушением функции иммунной системы,

Каждая таблетка содержит 36,9 мг декскетопрофена трометамола, в пересчете на декскетопрофен 25 мг. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмала гликолят), кремния диоксид коллоидный безводный (аэросил), магния стеарат; оболочка: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000), титана диоксид.

Внешний вид препарата Дексонал® и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с риской. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной (допустимо с перфорацией).

По 1, 3, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «АЛИУМ» (АО «АЛИУМ»)

Юридический адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2

Адрес производственной площадки: 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2

Выпускающий контроль: 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2, стр. 1

Телефон: +7 (495) 646-28-68

Адрес электронной почты: info@binnopharmgroup.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «АЛИУМ» (АО «АЛИУМ»)

Юридический адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2.

Тел.: +7 (495) 646-28-68,

Электронная почта: info@binnopharmgroup.ru

Республика Армения

АНО «Национальный научный центр фармаконадзора»

Адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, этаж 9, офис 923

Тел.: +7 499 504-15-19, +7 903 799-21-86

Электронная почта: adversereaction@drugsafety.ru

Республика Беларусь

АНО «Национальный научный центр фармаконадзора»

Адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, строение 2, этаж 9, офис 923

Тел.: +7 499 504-15-19, +7 903 799-21-86

Электронная почта: adversereaction@drugsafety.ru

Республика Казахстан

ТОО «LEKARSTVENNAYA BEZOPASNOST (Лекарственная безопасность)»

Адрес: 050047, Казахстан, город Алматы, Алатауский район, Микрорайон Саялы, д. 16, кв. 8

Тел.: +7 777 064 27 02, +7 499 504-15-19

Электронная почта: adversereaction@drugsafety.ru

Кыргызская Республика

АНО «Национальный научный центр фармаконадзора»

Адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, строение 2, этаж 9, офис 923

Тел.: +996 99 901-50-45, +7 499 504-15-19

Электронная почта: adversereaction@drugsafety.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о лекарственном препарате Дексонал® содержатся на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» <https://eec.eaeunion.org>