

**Листок-вкладыш – информация для потребителя**  
**Рамиприл Н, 5 мг+25 мг, таблетки**  
**Рамиприл Н, 10 мг+12,5 мг, таблетки**  
**Рамиприл Н, 10 мг+25 мг, таблетки**  
Действующие вещества: рамиприл+ гидрохлортиазид

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Рамиприл Н, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Рамиприл Н.
3. Прием препарата Рамиприл Н.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Рамиприл Н.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Рамиприл Н, и для чего его применяют**

Лекарственный препарат Рамиприл Н является комбинированным препаратом и содержит два действующих вещества – рамиприл и гидрохлортиазид. Рамиприл относится к группе лекарственных препаратов, называемых ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

Действие рамиприла основано на:

- снижении выработки организмом веществ, которые могут повысить артериальное давление;
- расширении и расслаблении кровеносных сосудов;
- облегчении работы сердца по продвижению крови по сосудам.

Гидрохлортиазид относится к группе тиазидных диуретиков. Гидрохлортиазид обладает мочегонным действием, то есть усиливает выведение жидкости с мочой, тем самым снижая артериальное давление.

Комбинированный препарат Рамиприл Н применяется в том случае, когда лечение с одним действующим веществом не приносит желаемого результата.

**Показания к применению**

Препарат Рамиприл Н применяется для лечения высокого артериального давления. Препарат Рамиприл Н показан к применению у взрослых.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед приемом препарата Рамиприл Н**

**Противопоказания**

**Не принимайте препарат Рамиприл Н:**

- если у Вас аллергия на рамиприл или другие ингибиторы АПФ, гидрохлортиазид или другие тиазидные диуретики, производные сульфонида или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша). Признаки аллергической реакции могут включать сыпь, затруднение глотания или дыхания, отек губ, лица, горла или языка;
- если у Вас когда-либо ранее наблюдалась тяжелая аллергическая реакция, называемая «ангионевротический отек». Проявления: отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить;
- если Вы применяете или недавно применяли препарат, содержащий комбинацию сакубитрил/валсартан (препарат, применяемый для лечения хронической сердечной недостаточности у взрослых) (см. раздел «Другие препараты и препарат Рамиприл Н»);
- если Вы проходите процедуру диализа или гемофильтрации (процедуры искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма);
- если у Вас заболевание почек, при котором кровоснабжение почки уменьшается (стеноз почечной артерии);
- во втором и третьем триместрах беременности (см. раздел «Беременность и грудное вскармливание»);
- если Вы кормите грудью (см. раздел «Беременность и грудное вскармливание»);
- если у Вас тяжелая почечная или печеночная недостаточность (см. раздел 3);
- если лабораторно установлено, что у Вас концентрация солей (кальция, калия, натрия) в крови выходит за пределы нормы (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»);
- если у Вас печеночная энцефалопатия (нарушение функции головного мозга у пациентов с развивающейся печеночной недостаточностью);
- если у Вас диабет или нарушение функции почек, и Вы применяете препарат для снижения давления, содержащий алискирен (см. раздел «Другие препараты и препарат Рамиприл Н»). Не принимайте препарат Рамиприл Н, если к Вам относится что-либо из вышеперечисленного. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как принимать препарат Рамиприл Н.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Рамиприл Н проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Перед применением препарата Рамиприл Н сообщите лечащему врачу о следующих состояниях:

- если у Вас имеются заболевания сердца, печени, почек или надпочечников;
- если у Вас наблюдались значительные потери солей или жидкости (у Вас была рвота, диарея, повышенное потоотделение, пребывание на диете с низким содержанием соли, длительное применение мочегонных препаратов, лечение диализом);
- если Вам предстоит лечение для уменьшения аллергии на укусы пчел или ос (десенсибилизация);
- если Вам предстоит применение анестезии (например, при хирургической или стоматологической операции), Вам может потребоваться прекратить применение лекарственного препарата Рамиприл Н за день до этого. Проконсультируйтесь с врачом;
- если у Вас высокое содержание калия в крови (по результатам анализа крови);
- если Вы применяете препараты или подвергаетесь условиям, которые могут снизить уровень натрия в крови. Ваш врач может назначать регулярные анализы крови, в отдельности для контроля уровня натрия в крови, особенно если Вы пожилой человек;
- если Вы применяете препараты, которые могут повысить риск возникновения ангионевротического отека – серьезной аллергической реакции, такие как ингибиторы

mTOR (например, темсиролимус, эверолимус, сиролимус), вилдаглиптин, ингибиторы неприлизина (рацекадотрил) или сакубитрил/валсартан (см. раздел «Не принимайте препарат Рамиприл Н»);

- если у Вас когда-либо наблюдались проблемы с дыханием или органами дыхания (включая воспаление или скопление жидкости в легких) после приема гидрохлортиазида;
- если у Вас диффузное поражение соединительной ткани, такое как склеродермия или системная красная волчанка;
- если Вы беременны или планируете беременность. Препарат Рамиприл Н не рекомендуется принимать в первые 3 месяца беременности; препарат Рамиприл Н может нанести серьезный вред ребенку после 3 месяцев беременности (см. раздел «Беременность и грудное вскармливание»);
- если у Вас ухудшение зрения или боль в глазах. Это могут быть симптомы скопления жидкости в сосудистом слое глаза (хориоидальный выпот) или повышения внутриглазного давления (глаукома). При отсутствии лечения данное состояние может привести к необратимой потере зрения. Если у Вас раньше была аллергия на пенициллин или сульфонамид, Вы можете быть подвержены более высокому риску ее развития. Вам следует прекратить лечение препаратом Рамиприл Н и немедленно обратиться за медицинской помощью;
- если Вы профессиональный спортсмен и регулярно проходите процедуры допинг-контроля;
- если у Вас сахарный диабет и Вы принимаете соответствующие препараты. Возможно, Ваш врач изменит дозировку сахароснижающих препаратов на период приема препарата Рамиприл Н;
- если у Вас ранее наблюдались новообразования на коже либо был диагностирован рак кожи во время или после применения (в особенности, длительного) гидрохлортиазида. Применение гидрохлортиазида, особенно длительный прием высоких доз, может повышать риск развития некоторых видов рака кожи и губ (немеланомный рак кожи). Если Вы принимаете гидрохлортиазид, необходимо защищать кожу от воздействия солнечных и ультрафиолетовых лучей;
- если Вы применяете любой из следующих лекарственных препаратов для снижения артериального давления:
  - антагонисты рецепторов ангиотензина II (также известные как «сартаны» - например, лозартан, валсартан, телмисартан, ирбесартан), особенно если у Вас есть проблемы с почками, связанные с сахарным диабетом;
  - алискирен.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам (или Вы не уверены), проконсультируйтесь с врачом перед тем, как принимать препарат Рамиприл Н.

### **Дети и подростки**

Рамиприл Н не рекомендуется применять у детей и подростков младше 18 лет, поскольку безопасность и эффективность препарата у детей не установлена.

### **Другие препараты и препарат Рамиприл Н**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Существуют препараты, которые нельзя сочетать друг с другом, а есть такие, при совместном применении которых необходимо корректировать дозы.

Сообщите врачу, если Вы применяете любой из следующих лекарственных препаратов. Они могут снизить эффект препарата Рамиприл Н:

- лекарственные препараты, применяемые для облегчения боли и воспаления (например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, индометацин и ацетилсалициловая кислота);

- лекарственные препараты, применяемые при низком артериальном давлении, шоке, сердечной недостаточности, астме или аллергии, такие как эфедрин, псевдоэфедрин или адреналин. Лечащему врачу потребуется проверить Ваше артериальное давление.

Сообщите врачу, если Вы применяете любой из следующих лекарственных препаратов. Они могут увеличить вероятность развития нежелательных реакций, если Вы принимаете их вместе с препаратом Рамиприл Н:

- сакубитрил/валсартан – применяется для лечения хронической сердечной недостаточности у взрослых (см. раздел «Не принимайте препарат Рамиприл Н»);
- препараты, применяемые для облегчения боли и воспаления (НПВП, такие как ибупрофен, индометацин и ацетилсалициловая кислота);
- препараты, снижающие уровень калия в крови. К ним относятся препараты для лечения запора, диуретики (мочегонные средства), амфотерицин В (препарат для лечения грибковых инфекций) и АКТГ (используется для оценки функции надпочечников);
- лекарственные препараты для лечения рака (химиотерапия);
- препараты для лечения проблем с сердцем, включая проблемы с сердечбиением;
- препараты для предотвращения отторжения органов после трансплантации, такие как циклоспорин;
- диуретики (мочегонные средства), такие как фуросемид;
- препараты, которые могут повысить уровень калия в крови, такие как спиронолактон, триамтерен, амилорид, соли калия, триметоприм или в комбинации с сульфаметоксазолом (при инфекциях), гепарин (для разжижения крови);
- кортикостероиды для лечения воспаления, такие как преднизолон;
- добавки кальция;
- аллопуринол (применяется для снижения уровня мочевой кислоты в крови);
- прокаинамид (применяется при нарушениях сердечного ритма);
- колестирамин (для снижения уровня жиров в крови);
- карбамазепин (применяется для лечения эпилепсии);
- гепарин (применяется для разжижения крови);
- темсиrolimus (препарат для лечения рака);
- сиролимус, эверолимус (для профилактики отторжения трансплантата);
- вилдаглиптин (применяется для лечения сахарного диабета 2 типа);
- рацекадотрил (препарат для лечения диареи);
- Вашему лечащему врачу может потребоваться скорректировать дозу и/или принять другие меры предосторожности, если Вы применяете антагонисты рецепторов ангиотензина II или алискирен (также ознакомьтесь с информацией под заголовками «Не принимайте препарат Рамиприл Н» и «Особые указания и меры предосторожности»).

Сообщите врачу, если Вы применяете любой из следующих лекарственных препаратов. Рамиприл Н может повлиять на их эффективность:

- препараты для лечения сахарного диабета, такие как пероральные сахароснижающие препараты и инсулин. Рамиприл Н может снизить уровень глюкозы в крови. Проверяйте уровень глюкозы в крови во время лечения препаратом Рамиприл Н;
- литий (применяется для лечения психических заболеваний). Препарат Рамиприл Н может повысить уровень лития в крови. Содержание лития в крови должно тщательно контролироваться лечащим врачом;
- препараты для расслабления мышц;
- хинин (для лечения малярии);
- йодсодержащие препараты, которые используются при проведении сканирования или рентгенографии;
- пенициллин (для лечения инфекций);

– препараты для разжижения крови (пероральные антикоагулянты), такие как варфарин.  
Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам (или Вы не уверены), проконсультируйтесь с врачом перед тем, как принимать Рамиприл Н.

### **Тесты**

Перед приемом препарата Рамиприл Н проконсультируйтесь с врачом:

- если Вы проходите тест на функцию паращитовидной железы. Препарат Рамиприл Н может повлиять на результаты теста;
- если Вы занимаетесь спортом и проходите антидопинговый тест. Препарат Рамиприл Н может дать положительный результат.

### **Препарат Рамиприл Н с пищей, напитками и алкоголем**

Употребление алкоголя совместно с препаратом Рамиприл Н может вызвать головокружение. Если Вы не уверены, можно ли употреблять алкоголь во время лечения препаратом Рамиприл Н, обсудите это с врачом, так как препараты, используемые для снижения артериального давления, и алкоголь усиливают эффекты друг друга.

Препарат Рамиприл Н можно принимать независимо от приема пищи.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### Беременность

Не следует принимать Рамиприл Н в течение первых 12 недель беременности. Следует полностью прекратить прием препарата Рамиприл Н с 13-й недели беременности, так как он может нанести вред Вашему ребенку.

Если Вы забеременели во время лечения препаратом Рамиприл Н, сразу же сообщите об этом своему лечащему врачу. Переход на подходящее альтернативное лечение должен быть осуществлен до планируемой беременности.

#### Грудное вскармливание

Препарат Рамиприл Н не следует принимать кормящим матерям. Обратитесь к лечащему врачу для получения рекомендаций, прежде чем принимать какие-либо лекарственные препараты.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Некоторые нежелательные реакции (например, головокружение) могут ухудшить концентрацию внимания и скорость реакции. Это представляет собой риск, когда эти способности имеют особое значение (например, при управлении транспортным средством или работе с механизмами). Возникновение головокружения наиболее вероятно в начале применения препарата, а также при повышении дозы. В случае появления головокружения воздержитесь от управления транспортным средством и работы с механическим оборудованием.

### **Препарат Рамиприл Н содержит лактозу**

Лекарственный препарат Рамиприл Н содержит лактозы моногидрат. Если Ваш врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, Вам следует проконсультироваться с ним перед приемом препарата Рамиприл Н.

## **3. Прием препарата Рамиприл Н**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

### **Рекомендуемая доза**

Ваш врач подберет дозу для достижения контроля артериального давления в индивидуальном порядке.

Максимальная доза не должна превышать 10 мг рамиприла и 25 мг гидрохлортиазида в сутки.

### **Особые группы пациентов**

#### *Пациенты пожилого возраста*

Перед применением препарата Рамиприл Н проконсультируйтесь с лечащим врачом. Врач подберет дозу в индивидуальном порядке.

#### *Пациенты, принимающие мочегонные препараты*

Если Вы принимаете мочегонные препараты, проконсультируйтесь с врачом перед приемом препарата Рамиприл Н, так как он содержит гидрохлортиазид, обладающий мочегонным действием.

#### *Пациенты с нарушением функции почек*

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у Вас диагностировано умеренное нарушение функции почек. Препарат Рамиприл Н противопоказан пациентам с тяжелым нарушением функции почек (см. раздел «Не принимайте препарат Рамиприл Н»).

#### *Пациенты с нарушением функции печени*

Если у Вас диагностировано нарушение функции печени от легкой до средней степени тяжести, прием препарата Рамиприл Н следует начинать под тщательным наблюдением врача. В данном случае Вам показана исключительно низкая доза препарата Рамиприл Н (2,5 мг/12,5 мг). Препарат Рамиприл Н противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени (см. раздел «Не принимайте препарат Рамиприл Н»).

### **Дети и подростки**

Препарат Рамиприл Н не следует применять у детей и подростков ввиду недостаточности данных по эффективности и безопасности.

### **Путь и (или) способ введения**

Для приема внутрь.

Препарат Рамиприл Н рекомендуется принимать ежедневно 1 раз в сутки в одно и то же время, как правило, утром.

Таблетку необходимо проглотить целиком, запивая достаточным количеством жидкости (например, одним стаканом воды). Ее нельзя разжевывать или измельчать.

Таблетку Рамиприл Н 5 мг+25 мг можно разделить по риске на равные дозы.

Препарат Рамиприл Н можно принимать независимо от приема пищи.

### **Если Вы приняли препарата Рамиприл Н больше, чем следовало**

Если Вы приняли больше таблеток, чем следует, либо если Ваш ребенок случайно проглотил таблетку/таблетки, обратитесь к врачу или в ближайшее отделение скорой помощи/больницы. По возможности возьмите с собой упаковку с данным лекарственным препаратом и/или данный листок-вкладыш.

### **Если Вы забыли принять препарат Рамиприл Н**

Если Вы забыли принять дозу препарата, полностью пропустите прием этой дозы. Примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата для восполнения пропущенной.

### **Если Вы прекратили прием препарата Рамиприл Н**

Длительность лечения препаратом определяет врач. Не прекращайте лечение, даже если чувствуете улучшение, так как в случае прекращения лечения ранее, чем рекомендовано, состояние может ухудшиться.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

#### 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Некоторые нежелательные реакции требуют немедленной медицинской помощи.**

Если Вы заметили у себя появление каких-либо из следующих симптомов, **прекратите применение лекарственного препарата и немедленно обратитесь к врачу:**

- отек лица, губ или горла, затруднение глотания или дыхания, а также зуд и сыпь. Это может быть признаком тяжелой аллергической реакции на прием препарата;
- тяжелые кожные реакции, включая сыпь, язвы в полости рта, ухудшение уже существующего кожного заболевания, покраснение, вздутие или отслоение кожи (например, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз или мультиформная эритема).

**Немедленно сообщите Вашему лечащему врачу, если у Вас появятся:**

- учащение сердцебиения, нерегулярное или слишком сильное сердцебиение, боль в грудной клетке, чувство сжатия в груди или же более серьезные нарушения, в том числе сердечный приступ или инсульт;
- одышка или кашель, повышение температуры тела, сохраняющееся от 2 до 3 дней, и снижение аппетита. Это может указывать на заболевания легких;
- неожиданное появление кровоподтеков, кровотечения дольше обычного, какие-либо другие признаки кровотечения (например, кровоточивость десен), появление пурпурных пятен и высыпаний на коже, повышенная подверженность организма инфекционным заболеваниям, боль в горле, повышенная температура тела, чувство усталости, слабость, головокружение или бледность кожи. Эти симптомы могут указывать на заболевания крови или костного мозга;
- сильная боль в животе, отдающая в спину. Это может быть признаком панкреатита (воспаление поджелудочной железы);
- лихорадка, озноб, усталость, потеря аппетита, боль в животе, тошнота, пожелтение кожи или глаз (желтуха). Эти симптомы могут указывать на заболевания печени, например, гепатит (воспаление печени) или поражение печени;
- снижение зрения или боль в глазах вследствие высокого внутриглазного давления (возможные признаки накопления жидкости в сосудистом слое глаза (хориоидальный выпот) или острой закрытоугольной глаукомы).

#### **Другие возможные нежелательные реакции**

Сообщите лечащему врачу, если какой-либо из следующих симптомов усугубляется или длится дольше нескольких дней.

Частые нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль, чувство усталости;
- головокружение (возникновение более вероятно в начале лечения препаратом или при повышении дозы);
- сухой раздражающий кашель или бронхит;
- повышенный уровень глюкозы в крови. Если у Вас сахарный диабет, прием препарата Рамиприл Н может усугубить течение этого заболевания;
- повышенный уровень мочевой кислоты и липидов в крови;
- обострение подагры (отложение солей мочевой кислоты в суставах).

Нечастые нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- кожная сыпь с припухлостью или без нее;
- приливы (резкое ощущение жара с покраснением лица и потоотделением), обмороки, ортостатическая гипотензия (аномально низкое артериальное давление), особенно когда Вы быстро встаете или садитесь;
- вертиго (нарушения равновесия);

- зуд и необычная чувствительность кожи, например, онемение, покалывание, ощущение «мурашек» на коже (парестезия);
- потеря или изменение вкусовых ощущений;
- нарушение сна, сонливость;
- подавленное настроение, беспокойство, нервозность, возбужденное состояние;
- заложенность носа, воспаление пазух (синусит), одышка;
- отек и воспаление десен (гингивит);
- покраснение, зуд и отек глаз, слезотечение;
- звон в ушах;
- нечеткость зрения;
- выпадение волос;
- боли в груди;
- боли в мышцах;
- запор, боль в животе или кишечнике;
- расстройство желудка, тошнота;
- учащенное мочеиспускание в течение дня;
- чрезмерное потоотделение и чувство жажды;
- потеря или снижение аппетита (анорексия), снижение чувства голода;
- учащенное или нерегулярное сердцебиение;
- отек рук и ног, это может быть признаками задержки жидкости в организме;
- повышение температуры тела;
- нарушение половой функции у мужчин;
- снижение числа лейкоцитов (белые кровяные клетки), эритроцитов (красные кровяные клетки), тромбоцитов (клетки крови, участвующие в свертывании крови), снижение гемоглобина;
- анализы крови, показывающие изменения в работе печени, поджелудочной железы или почек;
- снижение уровня калия в крови.

Очень редкие нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- тошнота, диарея (понос) или изжога;
- воспаление языка (глоссит) или сухость во рту;
- увеличение содержания калия в крови;
- острый респираторный дистресс-синдром (дыхательная недостаточность с одышкой, частым и поверхностным дыханием).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно). Если какой-либо из нижеперечисленных симптомов длится дольше нескольких дней, сообщите об этом своему лечащему врачу:

- трудности с концентрацией внимания, беспокойство или спутанность сознания;
- изменение цвета пальцев рук и ног на холоде и покалывание или боль в тепле. Это может быть признаком синдрома Рейно;
- увеличение молочных желез у мужчин;
- образование тромбов;
- нарушение слуха;
- сухость глаз;
- ксантопсия (нарушение зрения, при котором все предметы кажутся окрашенными в желтый цвет);
- обезвоживание;
- отек, боль и покраснение в области щек (воспаление слюнных желез);
- ангионевротический отек кишечника (проявления: боль в животе, рвота, диарея);
- повышенная чувствительность кожи к солнечному свету;

- сильное шелушение кожи, зудящая сыпь или другие кожные реакции, такие как красная сыпь в области лица или лба;
- кожная сыпь или синяки;
- пятна на коже и холодные конечности;
- проблемы с ногтями (например, полное или частичное отделение ногтя от ложа);
- мышечная скованность или невозможность двигать челюстью (тетания);
- мышечная слабость или судороги;
- снижение полового влечения у мужчин и женщин;
- кровь в моче, это может быть признаком заболевания почек (интерстициальный нефрит);
- сахар в моче;
- повышенное количество определенных лейкоцитов в крови (эозинофилия);
- снижение числа клеток крови (панцитопения);
- изменение уровня электролитов (натрий, кальций, магний, хлор) в анализах крови;
- концентрированная моча (темного цвета), тошнота, мышечные судороги, спутанность сознания и конвульсии, которые могут быть вызваны нарушением секреции антидиуретического гормона (АДГ). При появлении таких симптомов как можно скорее необходимо обратиться к врачу;
- замедление или нарушение реакций;
- нарушение обоняния;
- затрудненное дыхание или обострение астмы;
- рак кожи и губ (немеланомный рак кожи).

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а.

Тел.: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

<http://www.rceth.by>

#### **5. Хранение препарата Рамиприл Н**

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25°C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

##### **Препарат Рамиприл Н содержит**

Действующими веществами являются рамиприл и гидрохлортиазид.

##### **Рамиприл Н 5 мг+25 мг**

Каждая таблетка содержит 5,0 мг рамиприла и 25,0 мг гидрохлортиазида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются микрокристаллическая (МКЦ 101), крахмал кукурузный, кроскармеллоза натрия (Е 468), повидон К30, натрия стеарил фумарат, лактозы моногидрат.

**Рамиприл Н 10 мг+12,5 мг**

Каждая таблетка содержит 10,0 мг рамиприла и 12,5 мг гидрохлортиазида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ 101), крахмал кукурузный, кроскармеллоза натрия (Е 468), повидон К30, натрия стеарил фумарат, лактозы моногидрат.

**Рамиприл Н 10 мг+25 мг**

Каждая таблетка содержит 10,0 мг рамиприла и 25,0 мг гидрохлортиазида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ 101), крахмал кукурузный, кроскармеллоза натрия (Е 468), повидон К30, натрия стеарил фумарат, лактозы моногидрат.

Препарат Рамиприл Р содержит лактозу (см. раздел 2).

**Внешний вид препарата Рамиприл Н и содержимое упаковки**

Таблетки.

Рамиприл Н, 5 мг+25 мг: круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета с риской на одной стороне.

Рамиприл Н, 10 мг+12,5 мг: круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета.

Рамиприл Н, 10 мг+25 мг: круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной белого цвета и гибкой упаковки на основе фольги алюминиевой. Каждые 3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещены в пачку из картона.

**Категория отпуска лекарственного препарата**

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

ООО «Фармтехнология»

Республика Беларусь

220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22

Телефон/факс: (017) 309 44 88

E-mail: ft@ft.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

**Прочие источники информации**

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза <https://www.rceth.by/>