


ЛДРБ  
86 19 - 20 17



## Листок-вкладыш лекарственного средства

Уважаемый пациент,

Внимательно прочитайте инструкцию перед приемом препарата.

Сохраните инструкцию, возможно, Вам потребуется перечитать ее снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

### Синупрет®

**Лекарственное средство, содержащее в качестве действующих веществ компоненты растительного происхождения, применяется при лечении воспаления придаточных пазух носа (синусита).**

### Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

### Состав

100 г капель содержат 29 г экстракта (1:11) из 2,6 г смеси  
корня горечавки (*Gentianae radix*),  
цветков первоцвета (*Primulae flos*),  
травы щавеля (*Rumicis herba*),  
цветков бузины (*Sambuci flos*),  
травы вербены (*Verbenae herba*)

(1:3:3:3:3), экстрагирующее вещество этанол 59% об.

Вспомогательные ингредиенты: вода очищенная.

Содержание этанола: 19 % (в объемном отношении)

### Описание

Прозрачная или слегка мутная жидкость желто-коричневого цвета с ароматным запахом и ароматным, горьковатым вкусом. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

### Производитель:

БИОНОРИКА СЕ

Кершенштайнерштрассе 11-15,

92318 Ноймаркт

Телефон: +49 (0) 9181 231-90

Факс: +49 (0) 9181 231-265


Интернет: [www.bionorica.de](http://www.bionorica.de)

Представительство в Республике Беларусь

220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А, пом. 25,

Тел.: +375 17 388 75 27, +375 17 388 75 28, +375 17 388 75 29

e-mail: [office@bionorica.by](mailto:office@bionorica.by)



### **Показания к применению**

В комплексной терапии острого и хронического воспаления придаточных пазух носа (синусита).

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

### **Предостережения и меры предосторожности**

Отсутствуют достаточные данные о применении лекарственного средства у детей до 2 лет. Лекарственное средство не следует применять у детей до 2 лет.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются более 7 -14 дней, ухудшаются, или повторяются периодически и / или у вас возникает постоянная лихорадка, сильная боль или неясные жалобы, то необходимо проконсультироваться с врачом.

В случае заболевания гастритом, а так же для пациентов с чувствительным желудком, требуется особая осторожность при приеме данного препарата. Синупрет® капли следует принимать предпочтительно после еды и запивая стаканом воды.

Данный лекарственный препарат содержит 19 % (об/об) этанола, то есть 450 мг на разовую дозу (50 капель), что равно 11 мл пива или 5 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом. Необходимо учитывать беременным и кормящим грудью женщинам, детям и таким группам высокого риска, как пациенты с заболеваниями печени или эпилепсией.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Применение в период беременности и кормления грудью**

Беременные и кормящие грудью женщины могут принимать лекарственное средство только по назначению врача после оценки соотношения риск/польза.

### **Влияния на способность управлять автомобилем или механизмами**

Лекарственное средство содержит этиловый спирт. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Способ применения и дозы**

Если врач не назначил другой дозировки:

Взрослым и детям старше 12 лет - по 50 капель (соответствует 3,0 мл) 3 раза в день.

Дети от 6 до 11 лет – по 25 капель (соответствует 1,5 мл) 3 раза в день.

Дети от 2 до 5 лет - по 15 капель (соответствует 0,9 мл) 3 раза в день.

Для уменьшения горького вкуса капли можно принимать с небольшим количеством воды.



Продолжительность приема лекарственного средства составляет 7-14 дней, если врачом не назначено иначе. См. раздел «Меры предосторожности»

### **Побочное действие**

Возможны следующие побочные реакции: нечасто - желудочно-кишечные расстройства (например, боль в животе, тошнота), редко – аллергические кожные реакции (сыпь, покраснение кожи, зуд) и тяжелые аллергические реакции (ангионевротический отек (отек Квинке), одышка, отек лица). В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Передозировка**

Случаи передозировки препарата описаны не были. В случае передозировки побочные действия, перечисленные выше, могут быть более интенсивными. В случае употребления препарата в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.

### **Условия хранения и срок годности**

Срок годности указан на упаковке.

Открытые флаконы можно использовать в течение 3 месяцев.

Не применять после окончания срока годности!

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Упаковка**

Флаконы темного стекла с дозирующим устройством по 100 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению помещаются в складную картонную коробку.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача