**Листок-вкладыш лекарственного средства**

Уважаемый пациент,

Внимательно прочитайте инструкцию перед приемом препарата.

Сохраните инструкцию, возможно, Вам потребуется перечитать ее снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Синупрет® форте

Лекарственное средство, содержащее в качестве действующих веществ исключительно компоненты растительного происхождения.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой

Состав

1 покрытая оболочкой таблетка содержит:

Трава вербены (Verbenaе herba)	36 мг
Корень горечавки (Gentianaе radix)	12 мг
Цветки первоцвета с чашечкой (Primulaе flos cum calycibus)	36 мг
Трава щавеля (Rumicis herba)	36 мг
Цветки бузины (Sambuci flos)	36 мг

Вспомогательные ингредиенты: сополимер бутилметакрилата основной, желатин, глюкоза жидкая (сухая субстанция), картофельный крахмал, лактоза моногидрат, кукурузный крахмал, декстрин, магния оксид легкий, монтан гликоль воск, рибофлавин (E101), касторовое масло рафинированное, сахароза, шеллак, кремния диоксид коллоидный безводный, сорбитол (E 420), стеариновая кислота, тальк, хлорофиллин (E 141), алюминиевый лак индигокармина (E 132), кальция карбонат (E 170), титана диоксид (E 171), вода очищенная


Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки зеленого цвета с гладкой поверхностью

Производитель:

БИОНОРИКА СЕ
Кершенштайнерштрассе 11-15,
92318 Ноймаркт

Представительство в Республике Беларусь
220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А, пом. 25,
Тел.: +375 17 388 75 27, +375 17 388 75 28, +375 17 388 75 29
e-mail: office@bionorica.by

**Фармакотерапевтическая группа:**

Прочие лекарственные средства, применяемые при простудных заболеваниях

Показания к применению

Острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа (синуситы).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Меры предосторожности

Не рекомендуется применять детям до 12 лет, в связи с недостаточностью необходимых данных. Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозо-галактозы, недостаточностью сахаразы-изомальтазы, непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью не следует принимать таблетки Синупрет® форте. Информация для больных сахарным диабетом: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0.03 хлебных единиц (ХЕ).

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются более 7-14 дней, ухудшаются, или повторяются периодически, и / или у вас возникает постоянная лихорадка, сильная боль или неясные жалобы, необходимо проконсультироваться с врачом.

В случае заболевания гастритом, а так же для пациентов с чувствительным желудком, требуется особая осторожность при приеме данного препарата. Синупрет® форте таблетки следует принимать предпочтительно после еды и запивая стаканом воды.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестны. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременные и кормящие грудью женщины могут принимать лекарственное средство после тщательной оценки врачом соотношения риск/польза.

Влияния на способность управлять автомобилем или механизмами

В рекомендованных дозировках лекарственное средство не оказывает влияния на способность управлять автомобилем или механизмами.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь

Взрослым и подросткам с 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день

Таблетки следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды.

Если врачом не назначено иное, рекомендуемая продолжительность приема препарата составляет 7-14 дней. См. раздел «Меры предосторожности».



Побочное действие

Нечасто возможно возникновение гастроинтестинальных расстройств (например, боли в верхней части живота, тошнота). Редко реакции гиперчувствительности (например, кожная сыпь, покраснение кожи, зуд). В отдельных случаях возможны аллергические реакции (например, отек Квинке, нарушение дыхания, отек лица).

В случае первых признаков аллергической реакции прекратить применение таблеток Синупрет® форте.

При появлении побочных эффектов следует прекратить прием лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки препарата описаны не были. В случае передозировки побочные действия, перечисленные выше, могут быть более интенсивными. В случае употребления препарата в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30°C.
Хранить в недоступном для детей месте!

Форма выпуска

По 20 таблеток в блистер. По 1 блистеру вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

По 25 таблеток в блистер. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

Условия отпуска лекарственного средства

Без рецепта врача