

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациента) по медицинскому применению лекарственного средства **ЦИТРАМОН-БОРИМЕД**

Перед приемом этого лекарства внимательно прочитайте весь листок-вкладыш:

- *Не выбрасывайте этот листок. Возможно, возникнет необходимость перечитать его.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к своему врачу, провизору или фармацевту.*
- *Это лекарство должно быть Вам выписано врачом. Не передавайте его другим. Это может нанести им вред, даже, если их симптомы такие же, как Ваши.*
- *Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным, или, если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите об этом врачу или фармацевту.*

Торговое название: Цитрамон-Боримед.

Форма выпуска: таблетки.

Описание: таблетки светло-коричневого цвета с белыми вкраплениями, с запахом какао, с плоской поверхностью, риской и фаской.

Состав: одна таблетка содержит: действующих веществ: ацетилсалициловой кислоты – 220 мг, парацетамола – 200 мг, кофеина – 27 мг, вспомогательные вещества: какао-порошок, лимонная кислота моногидрат, кремния диоксид коллоидный безводный, картофельный крахмал, тальк, стеариновая кислота.

Фармакотерапевтическая группа: прочие анальгетики и антипиретики.
Ацетилсалициловая кислота, комбинации, исключая психолептики.

Код АТХ: N02BA51.

Показания к применению

Цитрамон-Боримед используется для лечения приступов острой головной боли.

Противопоказания

Не принимайте Цитрамон-Боримед, если у Вас:

• **аллергия** (гиперчувствительность) на **ацетилсалициловую кислоту** (**аспирин**), **парацетамол**, **кофеин** или **любые другие ингредиенты Цитрамон-Боримед**, перечисленные в разделе «**Состав**».

К **симптомам аллергической реакции** можно отнести: астму, синдром легочной обструкции или затруднение дыхания; кожную сыпь или крапивницу; отек лица или языка; насморк. Если Вы не уверены, посоветуйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом.

• **когда-либо наблюдалась аллергическая реакция** на **другие лекарственные средства, используемые для снятия болевых синдромов, воспаления или лихорадки**, например, такие как диклофенак или ибuproфен.

• **язва желудка или кишечника**, или если у Вас в **анамнезе есть пептическая язва**.

• **появилась кровь в стуле** или **Ваш стул окрасился в черный цвет** (симптомы желудочно-кишечного кровотечения или перфорации).

• **гемофилия** или Вы страдаете от **других заболеваний крови**.

• **имеются серьезные проблемы с сердцем, печенью и почками**.


• имеется необходимость принимать **более чем 15 мг метотрексата** в **неделю** (см. раздел «**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**»).

• **последние 3 месяца беременности** (см. раздел «**Меры предосторожности**»).

• если Вы не достигли возраста 18 лет.

Меры предосторожности

Ниже указаны причины, по которым Цитрамон-Боримед не подходит для Вас. Посоветуйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем принимать данное лекарственное средство, если у Вас:



• ранее не была диагностирована мигрень, поскольку перед началом лечения необходимо исключить потенциальные серьезные заболевания, связанные с мозгом или нервной системой.

• наблюдается головная боль, отличная от обычной ~~и мигрени~~, которая настолько сильна, что требует постельного режима, или если у Вас существует рвота, связанная с головной болью и мигренью.

• начались головные боли **после травмы головы или после физической перегрузки, кашля или наклонов.**

• наблюдаются **хронические головные боли** (15 дней и более в течение месяца и продолжительностью более 3 месяцев), или если у Вас появились первые головные боли в возрасте старше 50 лет.

• присутствуют симптомы врожденного заболевания, называемого **дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы**, которое поражает эритроциты и может вызвать анемию, желтуху или увеличение селезенки при воздействии определенных продуктов, лекарственных средств, таких как некоторые противовоспалительные лекарственные средства (например, ацетилсалициловая кислота (аспирин)) или других заболеваний.

• когда-либо наблюдалась **проблемы с желудочно-кишечным трактом**, такие как язва желудка, кровотечение или черный стул. Если Вы ранее чувствовали дискомфорт в желудке или изжогу после приема болеутоляющих средств или противовоспалительных лекарственных средств.

• страдаете от **кровотечений или аномальных вагинальных кровотечений**, кроме менструального периода (например, необычно тяжелый и продолжительный менструальный период).

• если Вы недавно перенесли **хирургическое вмешательство** (в том числе незначительные, такие как стоматологические хирургические вмешательства) или, если оперативное вмешательство планируется в течение ближайших 7 дней.

• имеется **бронхиальная астма, сенная лихорадка, полипы в носу, хроническое респираторное заболевание или возникают аллергические симптомы** (например, кожная реакция, зуд, крапивница).

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
~~Республики Беларусь~~
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- имеется подагра, диабет, гипертиреоз, аритмия, неконтролируемая гипертензия, нарушение функции почек или печени;
- имеются проблемы с алкоголем.
- если Вы уже принимаете другие лекарственные средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту (аспирин) или парацетамол, или любые другие лекарственные средства, поскольку некоторые из них могут влиять на эффективность Цитрамон-Боримед и вызывать побочные эффекты.
- есть риск возникновения обезвоживания (например, от рвоты, диареи или до или после серьезной операции).

• возраст менее 18 лет. Существует возможная связь между принятием ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и возникновением синдрома Рейе, в том случае, когда она принимается детьми и подростками. Синдром Рейе - редкое заболевание, которое поражает мозг и печень и может иметь фатальный исход.

По этой причине Цитрамон-Боримед не следует давать детям или подросткам в возрасте до 18 лет, если это лекарственное средство специально не назначено Вашим лечащим врачом.

Другие меры предосторожности

Как и при принятии любого типа болеутоляющего средства от головных болей, слишком частое использование Цитрамон-Боримед (что означает более 10 дней в течение месяца для данного лекарственного средства) совпадающее с хроническими головными болями (в течение 15 и более дней в месяц), более 3 месяцев, может усилить Вашу головную боль или мигрень. Если Вы считаете, что это может быть причиной, то обратитесь за советом к своему лечащему врачу. Для решения проблемы Вам может потребоваться прекращение приема Цитрамон-Боримед.

Прием Цитрамон-Боримед может ослабить симптомы инфекционного заболевания (например, головную боль, высокую температуру) и, следовательно, может затруднить его диагностирование. Если Вы плохо себя чувствуете и Вам нужно обратиться к врачу, то не забудьте сообщить ему о том, что Вы принимаете Цитрамон-Боримед.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Прием Цитрамон-Боримед может повлиять на результаты лабораторных испытаний. Если у Вас проводится исследование крови, мочи или другое лабораторное обследование, то сообщите, что Вы принимаете Цитрамон-Боримед.

СОГЛАСОВАНО

Министерством здравоохранения
Республики Беларусь

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 100 от 27.01.2011 г.

Применение в период беременности и кормления грудью

Если Вы беременны или думаете, что можете быть беременными, не принимайте Цитрамон-Боримед. Особенно важно не принимать Цитрамон-Боримед в течение последних 3 месяцев беременности, поскольку это может нанести вред вашему будущему ребенку или вызвать проблемы при родах.

Не принимайте Цитрамон-Боримед, если Вы кормите грудью, поскольку это может быть вредно для Вашего ребенка.

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, провизором или фармацевтом, прежде чем принимать какие-либо лекарственные средства.

Цитрамон-Боримед относится к группе лекарств (нестероидные противовоспалительные средства), которые могут ухудшить репродуктивную функцию у женщин. Этот эффект обратим при прекращении приема лекарственного средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Использование Цитрамон-Боримед, как известно, не влияет на Вашу способность управлять автотранспортом и работать с механизмами.

Если Вы заметили побочные эффекты, такие как головокружение или сонливость, то Вы не должны управлять автомобилем или работать с машинами. Сообщите об этом своему лечащему врачу как можно скорее.

Применение у детей

Лекарственное средство противопоказано детям.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте Цитрамон-Боримед точно в соответствии с тем, как это указано в данном листке-вкладыше или в соответствии с тем, как на-

значил Ваш лечащий врач. Вы должны проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом в том случае, если Вы не уверены, как принимать лекарственное средство.

Взрослые (18 лет и старше):

• **Для лечения головной боли:**

При головной боли принять 1 таблетку, запив полным стаканом воды. При необходимости можно принять еще 1 таблетку через 4-6 часов.

При интенсивной головной боли принять 2 таблетки, запив полным стаканом воды. При необходимости можно принять еще 2 таблетки через 4-6 часов.

Не принимайте Цитрамон-Боримед более 4 дней для лечения головной боли, не проконсультировавшись с лечащим врачом.

Дети и подростки:

Цитрамон-Боримед не следует давать детям и подросткам в возрасте до 18 лет (см. раздел «Меры предосторожности»).

Пожилые люди:

Специальных рекомендаций по дозировке нет. Если у Вас низкая масса тела, Вам следует обратиться за советом к своему лечащему врачу, провизору или фармацевту.

Пациенты с заболеваниями почек или печени

Вы должны сообщить своему лечащему врачу, если у Вас имеются заболевания почек или печени. Возможно Вашему лечащему врачу потребуется отрегулировать интервал дозирования или продолжительность лечения. Не принимайте Цитрамон-Боримед, если Вы страдаете серьезными заболеваниями печени или почек.

Если Вы забыли принять Цитрамон-Боримед

Примите необходимую дозу сразу, как только вспомните, но не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу. Не принимайте более 6 таблеток в течение 24 часов.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы по поводу использования данного лекарственного средства, обратитесь к своему лечащему врачу, провизору или фармацевту.

Побочное действие

Как и все лекарственные средства, Цитрамон-Боримед может вызвать побочные эффекты, однако не у всех пациентов.

Прекратите принимать Цитрамон-Боримед и немедленно сообщите об этом лечащему врачу, если у Вас появились какие-либо из этих серьезных побочных эффектов:

- аллергическая реакция, сопровождающаяся отеком лица, губ, рта, языка или горла.

Это может вызвать затруднения при глотании, одышку, затруднение дыхания и ощущение стеснения в груди (признаки астмы). У Вас может также появиться сыпь или зуд, Вы можете испытать обморочное состояние.

- кожная сыпь (включая крапивницу, зуд), покраснение кожи, появление пузирей в области губ, глаз или рта, шелушение кожи, язвы, язвы во рту;
- кровотечения в желудке или кишечнике, язва желудка или кишечника, которая может сопровождаться тяжелой болью в желудке, кровавым или черным стулом или рвотой кровью. Как и у всех болеутоляющих и жаропонижающих лекарственных средств, это может произойти в любой момент во время лечения без предыстории и может стать фатальным.

Этот побочный эффект особенно серьезен для пожилых пациентов.

- пожелтение кожи или глаз (признаки печеночной недостаточности);
- предобморочное состояние или головокружение (признаки низкого кровяного давления);
- аритмия.

Ниже указаны побочные эффекты, выявленные при проведении клинических испытаний. Сообщите своему лечащему врачу, если Вы заметили какие-либо из данных побочных эффектов:

Часто (может наблюдаться у 1 из 10 человек):

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- нервозность, головокружение;
- тошнота, дискомфорт в области живота.

Нечасто (может наблюдаться у 1 из 100 человек):

- бессонница, дрожь, онемение, головная боль;
- звон в ушах;
- сухость во рту, диарея, рвота;
- усталость, чувство неуверенности;
- увеличение частоты сердечных сокращений.

Редко (может наблюдаться у 1 из 1000 человек):

- боль в горле, затруднение глотания, онемение или покалывание вокруг рта, увеличение слюноотделения;
- снижение аппетита, изменение вкуса;
- беспокойство, состояние эйфории, тревожное состояние;
- нарушение внимания, потеря памяти, изменение координации;
- ощущение боли в области щек и лба;
- боль в глазах, нарушение зрения;
- горячие приливы, проблемы с периферическими кровеносными сосудами (например, в руках или ногах);
- носовое кровотечение, медленное и редкое дыхание, насморк;
- отрыжка, метеоризм;
- чрезмерное потоотделение, зуд, зудящая сыпь, повышенная чувствительность кожи;
- скованность мышц, костей или суставов; боли в области шеи, боли в спине, спазмы мышц;
- слабость, дискомфорт в груди.

Ниже перечислены побочные эффекты, которые были зарегистрированы после поступления лекарственного средства в торговую сеть. В целом, частота развития побочных эффектов в постмаркетинговом исследовании не может быть определена точно, поэтому она обозначается как «не известно»:

- возбужденное состояние, ухудшение самочувствия по сравнению с обычным состоянием;
- сонливость, мигрень;
- покраснение кожи, сыпь. Сообщалось об очень ~~редких~~ редких случаях проявления серьезных кожных реакций;
- сердцебиение, одышка, внезапное затрудненное дыхание и чувство стеснения в груди с хрипом или кашлем (астма);
- боль в животе, дискомфорт в желудке после еды;
- увеличение ферментов печени.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения

очень ~~редких~~ редких случаях проявления

Сообщение о предполагаемых побочных реакциях

Если у Вас появились какие-либо симптомы, описанные или не описанные в данном листке-вкладыше, обязательно сообщите об этом Вашему лечащему врачу!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Пожалуйста, сообщите своему лечащему врачу, провизору или фармацевту о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие лекарственные средства, включая лекарственные средства, принимаемые без рецепта.

В частности, сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете одно из следующих лекарственных средств:

- любое другое лекарственное средство, содержащее парацетамол, ацетилсалициловую кислоту (аспирин) или любое другое болеутоляющее/жаропонижающее лекарственное средство;
- лекарственные средства, используемые для предотвращения свертывания крови («антикоагулянты»), такие как пероральные антикоагулянты (например, варфарин), гепарин, тромболитики (например, стрептокиназа) или другие антитромбоциты (тиколидин, клопидогрель, цилостазол);
- кортикостероиды (используемые для ослабления воспалительных процессов);
- барбитураты и бензодиазепины (для лечения симптомов тревожности и бессонницы);

- **литий, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или флуоксамин** (для лечения депрессии);
 - **сульфонилмочевина и инсулин** (для лечения ~~диабета~~);
 - **метотрексат** (для лечения некоторых видов ~~рака, артрита и язвы~~);
 - **некоторые лекарственные средства, используемые для лечения инфекций** (например, рифампицин, изониазид, хлорамфеникол, ципрофлоксацин или пипемидиновая кислота);
 - **левотироксин** (для лечения гипотиреоза);
 - **метоклопрамид** (для лечения тошноты и рвоты);
 - **лекарственные средства для лечения эпилепсии;**
 - **лекарственные средства для лечения высокого кровяного давления и лечения сердечной недостаточности;**
 - **диуретики** (для увеличения выработки мочи и уменьшения выработки избыточной жидкости);
 - **лекарственные средства для лечения подагры;**
 - **оральные контрацептивы;**
 - **зидовудин** (для лечения ВИЧ);
 - **лекарственные средства для лечения медленного опорожнения желудка**, такие как пропантелин;
 - **клозапин** (для лечения шизофрении);
 - **симпатомиметики** (для повышения низкого кровяного давления или для лечения симптомов заложенности носа);
 - **противоаллергические средства** (для предотвращения или снятия аллергии);
 - **теофиллин** (для лечения астмы);
 - **тербинафин** (для лечения грибковых инфекций);
 - **циметидин** (для лечения изжоги и пептических язв);
 - **дисульфирам** (для лечения алкогольной зависимости);
 - **никотин** (используется для прекращения курения);
 - **холестирамин** (для лечения высокого уровня холестерина).

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
~~Республики Беларусь~~

Прием Цитрамон-Боримед с едой и напитками

- Алкоголь:**

Следует избегать употребления алкогольных напитков ~~всё время~~ приёма лекарственного средства, так как одновременный приём парацетамола, ацетилсалициловой кислоты и алкогольных напитков повышает риск развития гепатотоксических эффектов и желудочно-кишечного кровотечения.

- Кофеин:**

В связи с наличием кофеина, следует ограничить потребление кофеиносодержащих лекарственных средств, продуктов или напитков до тех пор, пока Вы принимаете данное лекарственное средство, в связи с тем, что избыток кофеина может вызвать нервозность, раздражительность, бессонницу, а иногда и учащенное сердцебиение.

Передозировка

Данные таблетки содержат ацетилсалициловую кислоту (аспирин), парацетамол и кофеин. Не принимайте лекарственное средство больше рекомендуемой дозы и не принимайте никаких других лекарственных средств, которые могут содержать любую из этих активных фармацевтических субстанций или любые другие лекарственные средства, используемых для снятия симптомов боли, воспаления или жаропонижающие лекарственные средства (нестероидные противовоспалительные лекарственные средства) при использовании Цитрамон-Боримед.

Обратитесь к своему лечащему врачу, фармацевту или зайдите в ближайшую больницу, как только Вы подумаете, что, возможно, приняли большую дозу лекарственного средства, чем было назначено.

В этом случае немедленная медицинская помощь имеет решающее значение из-за потенциального риска необратимого повреждения печени вследствие передозировки парацетамола. Не ждите появления симптомов, поскольку передозировка изначально может не вызвать каких-либо заметных симптомов.

Если появляются симптомы передозировки, они могут иметь следующие признаки:

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
~~напитков~~ № 17 от 20.02.2014 г.

- При передозировке **ацетилсалициловой кислоты (аспирин)**: головокружение, звон в ушах, глухота, потливость, гипервентиляция, лихорадка, тошнота, рвота, головная боль, спутанность сознания или беспокойство, сердечная или дыхательная недостаточность.

- При передозировке **парацетамола**: первые симптомы, которые могут появиться: тошнота, рвота, отсутствие аппетита, бледность, головная боль, потливость и позднее боль в животе.

- При передозировке **кофеина**: чувство тревоги, нервозность, беспокойство, бессонница, возбуждение, подергивание мышц, спутанность сознания, судороги, гипергликемия, тахикардия или сердечная аритмия.

Даже если эти симптомы не появляются или они исчезают, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Упаковка

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1, 2, 3, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

6 таблеток в контурной безъячейковой упаковке. 1 контурную безъячейковую упаковку вместе с листком-вкладышем по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОГУТ
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПОЯВИТЬСЯ: ТОШНОТА, РВОТА, ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА, БЛЕДНОСТЬ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ПОГЛИ-