


Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства
для потребителя
ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА



Перед применением препарата полностью прочитайте инструкцию по медицинскому применению, поскольку в ней содержатся важные для Вас сведения.

- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 инструкции по медицинскому применению.

Содержание инструкции по медицинскому применению

1. Что собой представляет препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
3. Применение препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что собой представляет препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА, и для чего его применяют

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА обладает антибактериальной активностью по отношению к стафилококкам, а также антисептическим и противовоспалительным действием.

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА применяют в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, глотки и полости рта (трахеитов, ларингитов, фарингитов, гингивитов и стоматитов).

2. О чем следует знать перед применением препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА
Не принимайте препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА, если:

- у Вас гиперчувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата (см. Раздел 6);
- Вы беременны или кормите грудью;
- препарат противопоказан детям до 12 лет.

Не принимайте препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА для ингаляций, если:

- у Вас бронхиальная астма или бронхоспазм (сужение бронхов);
- у Вас коклюш.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите лечащему врачу перед применением препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у Вас были какие-либо заболевания печени, алкогольная зависимость;
- у Вас эпилепсия.

Если при применении симптомы Вашего заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развиваются нарушения дыхания, лихорадка, появляется гнойная мокрота), прекратите прием препарата и обратитесь к врачу.

Дети. Настойка эвкалипта противопоказана детям младше 12 лет. Не допускайте попадания препарата на область лица (особенно область носа) детей из-за риска развития бронхоспазма.

Другие препараты и препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Пожалуйста, сообщите своему врачу, если Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, включая препараты, полученные без рецепта или препараты растительного происхождения.

Препараты из листьев эвкалипта могут изменять активность ферментов печени, участвующих в метаболизме лекарственных средств.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, не применяйте настойку эвкалипта.

Если Вы начали принимать настойку эвкалипта, грудное вскармливание необходимо прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт! В период применения препарата воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Препарат ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА содержит этиловый спирт.

Содержание этанола - не менее 64,0 %.

Препарат вреден для лиц, страдающих алкогольной зависимостью.

Наличие этилового спирта необходимо учитывать беременным и кормящим женщинам, детям и группам высокого риска, таким как пациенты с заболеваниями печени или эпилепсией.

Этиловый спирт, содержащийся в данном лекарственном препарате, может повлиять на Вашу способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Лекарственное средство ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА применяется для полоскания и паровых ингаляций.

Количество процедур и продолжительность курса лечения, которые Вам подходят, определит Ваш лечащий врач в зависимости от характера и степени тяжести заболевания.

Не рекомендуется применять препарат более 1 недели.

Рекомендуемый режим дозирования

Для *полосканий* разводят 10-15 капель настойки в 200 мл теплой кипяченой воды.

Паровые *ингаляции* проводят с помощью ингаляторов любого типа, используя настойку в неразведенном состоянии или в разведении из расчета 10-15 капель в 200 мл теплой кипяченой воды, в объеме раствора, необходимом для проведения ингаляции.

Дети. Настойка эвкалипта противопоказана детям младше 12 лет.

Если Вы приняли препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА больше, чем следовало

Передозировка может привести к опасным для жизни отравлениям.

Основные симптомы при передозировке препаратом: тошнота, боль в животе спастического характера, снижение кровяного давления, расстройства кровообращения, бронхоспазм.

В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу.

Если Вы пропустили прием препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Если Вы забыли выполнить процедуру (полоскание или паровую ингаляцию) в назначенное время, выполните ее как можно быстрее.

Однако если наступило время для следующей процедуры, не увеличивайте дозу препарата и проведите процедуру как обычно.

Не используйте двойную дозу препарата (две дозы в одно и то же время), если Вы пропустили процедуру!

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно сообщите лечащему врачу, если Вы испытываете любой из перечисленных симптомов после применения этого препарата, так как симптомы могут ухудшаться:

тошнота; рвота; диарея; местные аллергические реакции (покраснение, сыпь, зуд и отек кожи), контактный дерматит (в области губ).

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Храните препарат в недоступном для детей месте. Возможно выпадение осадка.

Храните препарат в оригинальной упаковке.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на один флакон: спиртовое извлечение из эвкалипта прутовидного листьев 1 : 5.

Содержание этанола - не менее 64,0 %.

Внешний вид препарата ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА и содержимое упаковки

ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА представляет собой прозрачную жидкость от зеленовато-коричневого до бурого или зеленовато-бурого цвета, со специфическим запахом. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона или флаконы с этикеткой многостраничной помещают в ящики из картона.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Инструкция по медицинскому применению пересмотрена: