


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ по медицинскому применению лекарственного средства (информация для пациента) **АМИНАЛОН**

Торговое название: Аминалон.

Международное непатентованное название: отсутствует.

Форма выпуска: таблетки покрытые оболочкой 250 мг.

Описание: таблетки покрытые оболочкой белого или почти белого цвета, двояковыпуклые.

Состав: одна таблетка содержит: *действующего вещества:* гамма-аминомасляной кислоты – 250 мг; *вспомогательные вещества:* сахароза, пovidон, магния стеарат, опадрай II (в т.ч. спирт поливиниловый частично гидролизованный, тальк, макрогол 3350 (полиэтиленгликоль), лецитин (соевый), титана диоксид Е 171), мука пшеничная хлебопекарная, магния карбонат основной лёгкий, титана диоксид Е 171, воск пчелиный жёлтый, парафин твердый, масло подсолнечное рафинированное.

Фармакотерапевтическая группа: прочие психостимулирующие и ноотропные средства.


Код ATX: N06BX.

Показания к применению

- состояния после перенесенных нарушений мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм;
- психоорганический синдром;
- атеросклеротическая, гипертоническая и алкогольная энцефалопатия;

- детский церебральный паралич и последствия родовой травмы у детей в составе комплексной терапии;

- отставание умственного развития у детей;
- кинетозы (морская и воздушная болезнь).



Противопоказания

- повышенная чувствительность к аминалону и вспомогательным веществам, входящим в состав лекарственного средства;
- острыя почечная недостаточность;
- беременность (I триместр), период лактации;
- детский возраст до 6 лет.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь до еды.

Взрослым и детям старше 7 лет назначают внутрь по 0,5–1,25 г 3 раза в день.

Суточная доза – 1,5–3 г. *Детям в возрасте 6 лет* – 2,0-3,0 г/сут (8-12 таблеток) в 3 приема.

Курс лечения не менее 2-3 недель (оптимально 2-4 мес). При необходимости курсы повторяют 1-2 раза в год. Длительность курса лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

При лечении кинетозов назначают взрослым по 0,5 г (2 таблетки), детям по 0,25 г (1 таблетка) 3 раза в день в течение 3-4 сут, предшествующих поездке.

Побочное действие

- тошнота, рвота, диспепсические явления;
- повышение температуры тела, ощущение жара;
- бессонница;
- аллергические реакции;
- лабильность артериального давления.

При появлении побочных реакций, в том числе не указанных в данном листке-вкладыше, необходимо прекратить приём лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В случае одновременного приёма других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

При одновременном применении возможно усиление угнетающего воздействия на ЦНС производных бензодиазепина, противосудорожных и седативно-гипнотических средств.

Усиливает эффект гипотензивных препаратов при одновременном с ними применении.

При совместном применении с винпоцетином, нимодипином, ницерголином у пожилых лиц возможно развитие гипотонии и усугубление нарушений мозгового кровообращения в связи с развитием гипоперфузии мозга на фоне гипотонии.

Меры предосторожности

Если во время приёма лекарственного средства эффект отсутствует или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить приём лекарственного средства и обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит сахарозу, данное средство не следует принимать пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы.

Осторожность при использовании

Следует соблюдать особую осторожность при использовании аминалона у пациентов с лабильным АД в первые дни лечения, в связи с возможностью значительного колебания АД.

Беременность и лактация

При беременности и в период лактации безопасность и эффективность применения аминалона не установлены.

Особенности влияния препарата на способность управлять автотранспортом или потенциально опасными механизмами.

Во время применения Аминалона необходимо соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Аминалон обладает низкой токсичностью. Симптомы интоксикации возникают лишь при одномоментном применении чрезвычайно высоких доз аминалона (более 10-20 г) и характеризуются следующими *симптомами*: тошнотой, рвотой, болью в желудке, повышением температуры тела, головной болью, сонливостью и брадикардией.

Лечение. Специфического антидота не существует. *Меры помощи* включают отмену препарата, промывание желудка с активированным углем, назначение обволакивающих средств (диосмектит, слизь крахмала), поддерживающую и симптоматическую терапию, направленную на устранение возникших нарушений.

Упаковка

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

5 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177) 735612, 731156.