



**Листок-вкладыш: информация для потребителя**  
**Витапрост® Форте, суппозитории ректальные**  
Действующее вещество: простаты экстракт

НД РБ

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.

7257 - 2019

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 10 дней Вам следует обратиться к врачу.

**Содержание данного листка:**

1. Что из себя представляет препарат Витапрост® Форте, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Витапрост® Форте
3. Применение препарата Витапрост® Форте
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Витапрост® Форте
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что из себя представляет препарат Витапрост® Форте, и для чего его применяют**  
Действующим веществом препарата Витапрост® Форте является простаты экстракт, действие которого направлено на предстательную железу. Простаты экстракт уменьшает отек предстательной железы, уменьшает ее уплотнение, нормализует функцию клеток предстательной железы и стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Простаты экстракт также улучшает кровообращение в предстательной железе.

Витапрост® Форте нормализует функцию предстательной железы и ее секреции, уменьшает боль и дискомфорт, устраняет нарушение мочеиспускания, улучшает половую функцию.

**Показания к применению**

Хронический простатит (в составе комплексной терапии).

Добропачественная гиперплазия предстательной железы.

Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 10 дней, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед применением препарата Витапрост® Форте**

**Не применяйте препарат Витапрост® Форте:**

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на простаты экстракт или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6).

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Витапрост® Форте обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата Витапрост® Форте применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

В период применения препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы следует регулярно посещать врача для проведения стандартного контроля данного заболевания. Прежде чем начать курс лечения необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер.

#### **Дети и подростки**

Не применяйте препарат у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

#### **Другие препараты и Витапрост® Форте**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие лекарственные препараты. Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Препарат не применяют у женщин.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

### **3. Применение препарата Витапрост® Форте**

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза:**

По 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы 1 раз в день. После введения желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут.

Продолжительность курса лечения определяет лечащий врач. Минимальная продолжительность курса лечения препаратом Витапрост® Форте при доброкачественной гиперплазии предстательной железы - 15 дней, при хроническом простатите - 10 дней.

#### **Путь и способ введения**

Витапрост® Форте суппозитории следует использовать только ректально.

#### **Правила применения ректальных свечей:**

При использовании ректальных свечей нередко возникает спазм в животе и позыв к дефекации, поэтому перед процедурой выполните очистительную клизму или опорожните кишечник естественным путем.

Тщательно вымойте руки с мылом. Процедура должна проводиться в полной чистоте.

Заранее приготовьте влажные салфетки или носовой платок, смоченный в воде. Лягте на бок, прижав колени к животу. Для проведения процедуры эта поза наиболее удобна, так как позволяет свести к минимуму неприятные ощущения.

Извлеките свечу из упаковки. Свечу берут большим и средним пальцами правой руки в середине самой широкой части, указательный палец упирается в тупой конец свечи. Свечу направляют свободным концом к заднему проходу и проталкивают указательным пальцем в анальный канал до полного погружения на глубину 2-3 см. Проводите процедуру осторожно, не оказывая лишнего давления. Несмотря на то, что суппозиторий имеет обтекаемую форму, при неосторожном использовании можно травмировать слизистую

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

7257 - 2019

оболочку. Не вставайте с постели около 20 минут.

Протрите руки заранее приготовленной влажной салфеткой или носовым платком. Если в течение 10 минут после введения ректальной свечи произошел позыв к дефекации, опорожните кишечник и введите новый суппозиторий. Если между введением суппозитория и дефекацией прошло больше 10 минут, дополнительная доза лекарства не требуется.

**Если вы применили препарата Витапрост® Форте больше, чем следовало.**  
О случаях передозировки препарата Витапрост® Форте не сообщалось.

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении данного препарата возможны аллергические реакции.

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### 5. Хранение препарата Витапрост® Форте

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

##### Препарат Витапрост® Форте содержит

Действующим веществом является простаты экстракт.

Каждый суппозиторий содержит: простаты экстракт – 100 мг, в пересчете на водорастворимые пептиды – 20 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: жир твердый.

#### Внешний вид препарата Витапрост® Форте и содержимое упаковки

Суппозитории ректальные.

Суппозитории белого с желтоватым, коричневатым или сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория.

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

**Условия отпуска из аптек**

СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель  
АО «Нижфарм», Россия  
603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Все претензии потребителей направлять представителю держателя регистрационного  
удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:  
АО «Нижфарм», Россия  
603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7  
Тел.: (831) 278-80-88  
Факс: (831) 430-72-28  
E-mail: med@stada.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

