

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ГЕКСАЛИЗ

5488 - 2016

Регистрационный номер:

Торговое название: ГЕКСАЛИЗ

МНН: -



Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав (на 1 таблетку)

Действующие вещества:

Биклотимол 5,0 мг

Эноксолон 5,0 мг

Лизоцима гидрохлорид 5,0 мг

Вспомогательные вещества:

Лимонное масло 0,2 мг

Лимонной кислоты моногидрат 10,0 мг

Солнечный закат желтый (E110) 0,1 мг

Магния стеарат 15,0 мг

Камедь акации 60,0 мг

Сахароза до 1200 мг

Описание

Таблетки желто-оранжевого цвета круглой формы с фаской, с лимонным запахом. Возможны вкрапления оранжевого или белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Код АТХ: [R02AA20]. Средства для лечения заболеваний горла. Антисептики.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает противовоспалительным действием.

Обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных микроорганизмов.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Лекарственное средство показано для местного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и глотки, которые не сопровождаются повышением температуры тела.

В случае возникновения общих признаков бактериальной инфекции должно быть предусмотрено назначение антибиотиков для системного применения.

Противопоказания

Детский возраст до 6 лет.

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Таблетки рассасывают до полного растворения.

Взрослым назначают по 1 таблетке каждые 2 часа.

Максимальная суточная доза - 8 таблеток.

Детям старше 6 лет назначают по 1 таблетке каждые 4 часа.

Побочные действия

Аллергические реакции, суперинфекция. При длительном применении – дисбактериоз полости рта.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не использовать одновременно с другими препаратами, содержащими биклотимол, лизоцима гидрохлорид, эноксолон, чтобы не превысить максимально рекомендуемую дозу.

Избегать одновременного применения других местных средств.

Особые указания

Терапия должна быть пересмотрена через 5 дней, если симптомы заболевания не уменьшаются. Продолжительное применение лекарственного средства может нарушить

нормальную микрофлору полости рта.

Не следует использовать лекарственное средство пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы и недостаточностью сахаразы-изомальтазы.

Применение в период беременности и кормления грудью

Безопасность применения препарата при беременности не изучена. Поэтому, в целях предосторожности перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и движущимися механизмами

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и движущимися механизмами.

Форма выпуска

По 10 таблеток для рассасывания в блистерах (ПВХ-ПВДХ/алюминий). 3 блистера вместе с инструкцией по применению упакованы в картонную пачку.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения


При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель:

Лаборатории БУШАРА-РЕКОРДАТИ, Франция

**Представительство в Республике Беларусь:**

220073 Минск, 4-й Загородный пер., 58 «Б», офис 320

тел./факс: +375(17) 256 28 55