

НД РБ
3209 - 2018

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства для
специалистов**

ИНФЛЮЦИД

Общие физико-химические свойства

Таблетки белого или почти белого цвета, плоские, со скошенной кромкой, возможны незначительные вкрапления.

Состав лекарственного средства


1 таблетка (250 мг) содержит:

Активные вещества: Aconitum (*аконит аптечный*) D3 25 мг, Gelsemium (*гельземий вечнозелёный*) D3 25 мг, Ipecacuanha (*ипекакуана*) D3 25 мг, Phosphorus (*фосфор*) трит. D5 25 мг, Bryonia (*переступень двудомный*) D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum (*посконник пронзённостистый*) D1 25 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки



Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство

Код АТС: R05X. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Инфлюцид представляет собой гомеопатическое комбинированное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Традиционно применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний.

Инфлюцид содержит шесть проверенных гомеопатических компонентов, которые хорошо подходят для лечения острых лихорадочных простудных заболеваний, например, таких как грипп и гриппоподобные заболевания, которые характеризуются острым началом и быстрым нарастанием симптоматики.

Аконит используется преимущественно в первой фазе острых инфекций всей носоглотки и бронхов, даже если они встречаются в сочетании с лихорадкой. Бриония эффективна не только при простуде (насморке), но и при сухом бронхите с болезненным кашлем. Ипекакуана способствует разжижению бронхиального секрета и выведению трудноотделяемой мокроты. Гельземий эффективен, прежде всего, при острых простудных заболеваниях, остром рините и синусите с головными болями, а также при фарингите и ларингите. Фосфор оказывает положительное влияние, особенно при общей слабости, невралгии и головной боли при острых и хронических катарах дыхательных путей. Эупаториум один из самых надежных гомеопатических противогриппозных препаратов, прекрасно зарекомендовавший себя в лечении лихорадочных простудных заболеваний, гриппа, а также острого ринита.

Фармакокинетика.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Показания к применению

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний. Традиционно применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата (см. раздел «Состав лекарственного средства»); непереносимость пшеничного крахмала; дефицит лактазы, непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (см. раздел «Особые меры предосторожности»).

Детям до 1 года (в связи с отсутствием достаточного опыта применения).

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Инфлюцид применяют следующим образом. При острых состояниях: взрослые и подростки с 12 лет следует принимать по 1 таблетке каждые полчаса – 1 час (до 6 раз в сутки). Увеличение суточной дозы и длительности приёма более недели может осуществляться только после консультации с врачом. При уменьшении выраженности симптомов частота приёма снижается – по 1 таблетке 1-3 раза в сутки. В дальнейшем по мере улучшения состояния частота приёма снижается дополнительно.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают не более 4 таблеток в сутки (не более двух третей от суточной дозы у взрослых).

Дети в возрасте до 6 лет получают не более 3 таблеток в сутки (не более половины суточной дозы взрослых).

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. При лечении детей до 6 лет таблетки рекомендуется растворять в небольшом количестве воды.

Гомеопатические лекарственные средства не должны использоваться в течение длительного времени без консультации врача.

Побочные действия

Информация о нежелательных реакциях представлена в соответствии с системно-органной классификацией MedDRA и частотой встречаемости.

Частота нежелательных реакций, перечисленных при приеме препарата Инфлюцид, определяется согласно следующей шкале:

Очень часто ($\geq 1/10$)
Часто ($\geq 1/100$ до $< 1/10$)
Нечасто ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$)
Редко ($\geq 1/10000$ до $< 1/1000$)
Очень редко ($\geq 1/10000$)
Не известно (не может быть оценена по имеющимся данным)

Нарушения со стороны иммунной системы:


Частота не известна.

Реакции гиперчувствительности.

Желудочно-кишечные нарушения:

Частота не известна.

Желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота, рвота, диарея.



Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:

Частота неизвестна.


Высыпания на коже.

Сообщение о нежелательных реакциях:

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях и неэффективности лекарственных препаратов.

Передозировка

Вредные эффекты передозировки препарата Инфлюцид до настоящего времени не известны.



Особые меры предосторожности

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. При сохранении высокой температуры тела более 3 суток или при её повышении более 39°C, при сохранении симптомов или появлении новых симптомов может потребоваться назначение дополнительных обследований и другого лечения.

Предостережение для пациентов с целиакией. Инфлюцид содержит пшеничный крахмал, который может содержать небольшое количество глютена.

Пациентам с аллергией на пшеницу применять лекарственное средство не рекомендуется.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать данное лекарственное средство.

В связи с отсутствием достаточного опыта применения, Инфлюцид не следует применять у детей до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинических данных о применении лекарственного средства во время беременности и лактации недостаточно. Во время беременности и лактации препарат следует применять, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребёнка).

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

До настоящего времени не известны.

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

Условия хранения и срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 до 25°C в местах, недоступных для детей.

Срок годности данного гомеопатического лекарственного средства при условии его должного хранения в закрытой упаковке составляет **5 лет**.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере из плёнки ПВХ и фольги алюминиевой. 3 блистера пакуют в картонную коробку с листком-вкладышем для пациентов.

Информация о производителе (заявителе)

Заявитель / Владелец регистрационного удостоверения

Дойче Хомеопати Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел.: + 49 (0)721 40 93-01

Deutsche Homöopathie Union
DNU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. + 49 (0)721 40 93-01

СОГЛАСОВАНОМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬПриказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко КГ,
Германия

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG.,
Germany

Представитель в Республике Беларусь

Representative office of "Alpen Pharma AG"
220053 Minsk, Parhomenko street 3, office 1B
Tel./Fax (+375 17) 3480642.

Представительство компании "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь
22053 г, Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
Тел./факс (+375 17) 3480642.