


НД РБ

3074 - 2017



## Листок-вкладыш лекарственного средства

Уважаемый пациент,

Внимательно прочитайте инструкцию перед приемом препарата.

Сохраните инструкцию, возможно, Вам потребуется перечитать ее снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

### Синупрет®

**Лекарственное средство, содержащее в качестве действующих веществ компоненты растительного происхождения, применяется при острых и хронических воспалениях придаточных пазух носа (синусит)**

### Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой

### Состав

1 таблетка содержит измельченное лекарственное растительное сырье (порошок) из:

6 мг корня горечавки (*Gentianae radix*)

18 мг цветков первоцвета (*Primulae flos*)

18 мг травы щавеля (*Rumicis herba*)

18 мг цветков бузины (*Sambuci flos*)

18 мг травы вербены (*Verbenae herba*)

*Вспомогательные ингредиенты:* желатин, лактоза моногидрат, картофельный крахмал, кремния диоксид коллоидный безводный, сорбитол, стеариновая кислота, вода очищенная.

Оболочка: сополимер бутилметакрилата основной, кальция карбонат (E 170), касторовое масло рафинированное, хлорофиллин (E 141), декстрин, глюкоза жидкая (сухая субстанция), алюминиевый лак индигокармина (E 132), магния оксид легкий, кукурузный крахмал, монтан гликоль воск, рибофлавин (E101), шеллак, сахароза, тальк, титана диоксид (E 171).

### Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки зеленого цвета с гладкой поверхностью

### Производитель

БИОНОРИКА СЕ

Кершенштайнерштрассе 11-15,

92318 Ноймаркт

Представительство в Республике Беларусь

220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А, пом. 25,

Тел.: +375 17 388 75 27, +375 17 388 75 28, +375 17 388 75 29

e-mail: [office@bionorica.by](mailto:office@bionorica.by)

### Показания к применению

В комплексной терапии острого и хронического воспаления придаточных пазух носа (синусита)



## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

## **Предостережения и меры предосторожности**

Отсутствуют достаточные данные о применении лекарственного средства у детей до 6 лет. Лекарственное средство не следует применять у детей до 6 лет.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются более 7-14 дней, ухудшаются, или повторяются периодически, и / или у вас возникает постоянная лихорадка, сильная боль или неясные жалобы, то необходимо проконсультироваться с врачом.

Пациентам с непереносимостью фруктозы, непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать таблетки Синупрет®.

В случае заболевания гастритом, а также для пациентов с чувствительным желудком, требуется особая осторожность при приеме данного препарата. Синупрет® таблетки следует принимать предпочтительно после еды и запивая стаканом воды.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,01 хлебных единиц (ХЕ).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

## **Применение в период беременности и кормления грудью**

Беременные и кормящие грудью женщины могут принимать лекарственное средство только по назначению врача после оценки соотношения риск/польза.

## **Влияние на способность управлять автомобилем или механизмами**

Особых мер предосторожности не требуется.

## **Способ применения и дозировка**

Если врач не назначил другой дозировки:

Взрослым и детям старше 12 лет - по 2 таблетки 3 раза в день

Дети от 6 до 11 лет - по 1 таблетке 3 раза в день

Таблетки Синупрет® следует проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды.

Продолжительность приема лекарственного средства составляет 7-14 дней, если врачом не назначено иначе. См. раздел «Меры предосторожности»

## **Побочное действие**

Как и все лекарственные средства, Синупрет® таблетки могут вызывать побочные реакции. Возможны следующие побочные реакции: нечасто-желудочно-кишечные расстройства (например, боль в животе, тошнота), редко – аллергические кожные реакции (сыпь, покраснение кожи, зуд) и тяжелые аллергические реакции (ангионевротический отек (отек

НД РБ

3074 - 2017



Квинке), одышка, отек лица).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Передозировка**

Случаи передозировки препарата описаны не были. В случае передозировки побочные действия, перечисленные выше, могут быть более интенсивными. В случае употребления препарата в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.

### **Условия хранения и срок годности**

Хранить при температуре не выше 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности указан на упаковке.

Не применять после окончания срока годности!

### **Форма выпуска**

По 25 таблеток в блистер. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача