

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)

**Тысячелистника трава, измельченное сырье 50 г в пачке**  
**Millefolii herba**

**Общая характеристика:**

кусочки корзинок, отдельных цветков, листьев, стеблей различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет серовато-зеленый с беловато-желтоватыми вкраплениями.

Тысячелистника трава содержит флавоноиды, эфирное масло, витамин К, горечи, дубильные вещества, органические кислоты, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

**Фармакологические свойства.**

Тысячелистника трава обладает противовоспалительным, спазмолитическим, желчегонным и противомикробным действием.

**Показания к применению.** Внутрь: в составе комплексной терапии для симптоматического лечения нетяжелых функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (метеоризм, снижение аппетита); для симптоматического лечения слабовыраженных болей спастического характера во время менструации.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 7 г (1,5 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь в теплом виде по 1/3–1/2 стакана 2-3 раза в день за 30 мин до еды.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к тысячелистнику, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных); язва желудка и двенадцатиперстной кишки; обструкция желчевыводящих путей; беременность и период лактации; детский возраст до 12 лет.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. Противопоказано применение во время беременности. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время кормления грудью не рекомендовано.

**Применение у детей.** Применение у детей до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции. В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка.** Случаи передозировки не зарегистрированы.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Не изучалось.

**Меры предосторожности.** Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация о взаимодействиях отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.


**Условия и сроки хранения.** В защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

**Срок годности.** 3 года.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».



**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.  
**Тел.** 8 (0152) 68-45-79.  
**Сайт:** [www.biotest.by](http://www.biotest.by)

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОм ЗАДАЩИХ АНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерствам правосудия  
Республики Беларусь