



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)  
по применению  
лекарственного средства  
**ЭТАНОЛ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ**

**Название лекарственного средства – этанол антисептический**

**Описание** – прозрачная, бесцветная жидкость, с характерным спиртовым запахом; действующее вещество – спирт этиловый.

**Состав** – спирт этиловый 70 % 100 мл, 500 мл или 1000 мл.

**Форма выпуска** – раствор для наружного применения 70% спирта этилового.

**Фармакотерапевтическая группа** – дерматотропные средства, прочие антисептические и дезинфицирующие средства, спирт этиловый.

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Основные механизмы разрушения микробных клеток: деструктивный, ферментный, мембраноатакующий. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов, парентеральных гепатитов, а также грибов рода *Candida* sp. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 95 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки. Раздражающий эффект этанола тесно связан с его способностью легко растворяться в липидах и быстро проникать в глубокие слои кожи.

**Фармакокинетика**

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки. В метаболизме препарата участвует изофермент CYP2E1, индуктором которого он является.

**Показания к применению** – наружная терапия воспалительных заболеваний кожи инфекционной этиологии (начальные стадии фурункулов, панарициев); в качестве раздражающего средства (обтирания, компрессы); антисептическая обработка:

- кожи в местах инъекций лекарственных средств в домашних условиях у лиц с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, онкологические заболевания и др.;

- поверхностных повреждений кожи, ссадин, царапин, укусов насекомых;
- кожи рук медицинского персонала при доказанной ~~аллергии на другие~~ анти-септические лекарственные средства.

**Способ применения и дозировка** – применяется ~~только местно~~. При антисептической обработке кожи, перед производством ~~инъекций, равномерно нанести~~ на обрабатываемый участок кожи стерильным тампоном, увлажненным препаратом. При наружной терапии кожи – 1 мл средства на 1 см<sup>2</sup> кожи. При антисептической обработке кожи рук – 10 мл на одну обработку.

**Побочное действие** – возможно раздражение, сухость кожи при частом нанесении препарата на влажную кожу рук. При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение ЦНС). Вдыхание паров может вызвать сонливость и головную боль.

**Противопоказания** – острые воспалительные процессы с нарушением целостности кожи, гиперчувствительность.

**Передозировка** – явления передозировки при наружном применении препарата маловероятны.

**Меры предосторожности** – наносить только на сухую чистую кожу. Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей, беременных женщин и в период лактации, а также у пациентов с нарушением функции печени и почек. Легко воспламеняется. Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников возгорания. Не курить.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами** – не выявлено при местном применении.

**Условия хранения** – Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности** – 2 года.

**Условия отпуска** – упаковки 1000 мл; 500 мл – для стационаров. Упаковка 100 мл по рецепту.

**Упаковка** – По 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные крышкой; по 100 мл во флаконы с колпачком. Каждую бутылку (100 мл) вместе с листком- вкладышем помещают в пачку из картона № 2.

По 100, 500, 1000 мл в бутылки полиэтиленовые с навинчивающейся крышкой. Каждую бутылку (100 мл) вместе с листком- вкладышем помещают в пачку из картона № 1.

По 1000 мл в бутылки полимерные с крышкой; по 1000 мл во флаконы с колпачком.

По 20 (500 мл) или 10 (1000 мл) бутылок вместе с соответствующим количеством инструкций по применению помещают в ящики из гофрированного картона или термоусадочную плёнку.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

**Название и адрес производителя – ЗАО «БелАгроСитикс»** Республика Беларусь, 223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цинка, улица Армейская, 8 комн.7, тел. +375 17 500 33 11

